

STELLINGEN

1. De individuele roeiprestatie wordt méér door circulatoire dan door ventilatoire en metabole factoren bepaald.
2. Effecten van training vinden hun oorsprong voornamelijk in cellulaire enzymprocessen.
3. De submaximale inspanningsproef vormt bij uitstek de methode tot selectie in grotere groepen van sportlieden.
4. In gevallen van nephropathie ten gevolge van analgetica misbruik is de prognose voornamelijk afhankelijk van de aanwezigheid en de behandeling van een coexistente urine-weginfectie.
5. Bij het Syndroom van Horton heeft het histamine een oorzakelijke betekenis.
6. Pre-operatief onderzoek naar "dumping" is bij de indicatiestelling voor een maagresectie volgens Billroth II onmisbaar.
7. Van de gangbare chemische bepalingen geeft alleen het L.D.H. enige aanwijzing voor het bestaan van een longembolie.
8. Het gebruik van Dihydrostilboestrol als therapeuticum tegen vaginaal bloedverlies tijdens het eerste trimester van de graviditeit is ongeoorloofd.
9. Het vaccineren tegen Influenza is een vorm van experimentele geneeskunde.
10. Tekort aan slaap kan bij ziekenhuis-assistenten in opleiding resulteren in stemmingsveranderingen, passagère psychopathologisch gedrag en een geringer prestatievermogen.
11. Verantwoorde gastro-enterologie is tegenwoordig niet meer denkbaar zonder chemische flatusanalyse.
12. De meeste maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot een gebrek aan zelfdiscipline.

Errata

Men leze voor:

1. statische (in de inhoudsopgave 3.6 en op pagina 27), statistische.
2. oorzaken bij uitputting (op pagina 20), oorzaken van uitputting.
3. twee spirometers (op pagina 22), twee spirometerklokken.
4. 21 minutes and 42 seconds (op pagina-150), 29 minutes and 42 seconds.