

Stellingen

1

De exploratie van de thymus behoort een vast onderdeel van elke bijschildklieroperatie te zijn.

Dit proefschrift.

2

Gezien de zeldzaamheid van het werkelijke recidief van primaire hyperparathyreoïdie dient de door Paloyan e.a. gepropageerde preventieve subtotale parathyreoïdectomie niet te worden nagevolgd.

E. Paloyan e.a. Surg. Clin. N. Am.
79 : 43-48 (1969).

Dit proefschrift.

3

De grootte van de goed vrijgeprepareerde bijschildklier is voor de praktijk een afdoende criterium voor de functionele activiteit.

Dit proefschrift.

4

De prognose van het syndroom van Zollinger-Ellison houdt nauw verband met het gastrine gehalte van het bloed na totale maagresectie.

R. E. Bolinger e.a. Ann. Surg. 172:
504-521 (1970).

5

Heroperatie voor hyperthyreoïdie is een kunstfout.

A. J. Hedley e.a. Brit. Med. J. 1:
519-523 (1970).

6

Kinderen dienen na splenectomie gemiddeld gedurende één jaar profylactisch penicilline te krijgen.

7

Wanneer de gang van de patient naar de huisarts niet sterk wordt bevorderd door heropvoeding en eenvoudig te verkrijgen vervoersfaciliteiten, ontstaat vooral in de grote steden binnenkort een noodsituatie op dit gebied van de volksgezondheid.

8

Zwangerschapsonderbreking is bij de huidige stand van de medische wetenschap onmogelijk.

9

De benaming *unguis incarnatus* wordt ten onrechte gebruikt waar het een granulomatose van het nagelbed betreft.

G. Zachel Surg. Gyn. Obst. 137:
117-118 (1970).

10

Het ontstaan van stembandknobbeltjes bij *hard-rock* en *hot-pop* zangers kan niet worden voorkomen door elektroniese geluidsversterking.

E. M. Batza Clev. Quart. Clin. 38:
35-39 (1971).