

## STELLINGEN

### I

Indien bij een palpabele adnextumor, in de anamnese het zogenaamde “3f” symptomencomplex — fluxus in de menopauze, fluor, “fallopiodynie” — aange-troffen wordt, zou pre-operatief de diagnose carcinoom van de tuba Fallopii gesteld mogen worden.

### II

Het primaire tubacarcinoom dient bij de differentiaal-diagnose te worden betrokken bij een adnextumor, wanneer er sprake is van een “negatief” curettement en een “positief” uitstrijkje.

### III

De gewijzigde stadiumindeling van het primaire tubacarcinoom volgens *Erez* e.a. is een bruikbaar gegeven bij het vaststellen van de prognose.

*Erez, S. e.a. 1967, Am. J. Obst. & Gyn. 30 - Nr. 4.*

### IV

Post-operatieve supervoltage nabestraling van patiënten met tubacarcinoom geeft een langere overlevingsduur en een grotere remissieperiode.

*Fogh, I., 1969, Cancer 23 - 1332.*

### V

In landen, waar de bilharzia vaak voorkomt, denke men bij een palpabele adnex-zwelling ook aan de mogelijkheid van Schistosomiasis van de tuba Fallopii.

*Ali, R. e.a. 1956; Doc. de Med. Geogr. et Trop. Vol. 8 - 335.*

### VI

Bij de behandeling van de stress-incontinentie bij de vrouw overwege men de methode, waarbij de urethra verlengd wordt en het ostium urethrae externum verplaatst wordt.

*Bennett, M. e.a. 1970; The Journal of Obst. and Gyn. of the Brit. Comm., Vol. 77 - 738.*

## VII

Bij een éénzijdig dysgerminoom van het ovarium kan overwogen worden, een nabestraling achterwege te laten, als o.a. de kapsel niet doorbroken is.

## VIII

Bij recidief van een maagcarcinoom na een resectie is chirurgische therapie opnieuw aangewezen.

*Scheinin, T.M. c.a. 1968, Acta Chir. Scand. 134 - 660.*

## IX

Bij de geslachtsrijpe vrouw met diabetes mellitus verdient insuline therapie de voorkeur boven orale anti-diabetica.

## X

Na een gecompliceerde baring moet bij levende pasgeborenen rekening gehouden worden met het ontstaan van een intravasale stolling.

*Bleyl, U. c.a. 1970, Klin. Wschr. 48 - 13.*

## XI

In de post-operatieve "intensive care" afdeling dient de anaesthesist de coördinator te zijn van het behandelende team.

## XII

In die gevallen, waarbij er sprake is van een afstandskind, blijkt de baring vaak een opvallend vlot verloop te hebben.

## XIII

Het is dringend gewenst, dat in Suriname de verkoop van geneesmiddelen aan een wettelijke regeling gebonden wordt.

## XIV

Het verdient aanbeveling de EHBO dienst van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo uit te breiden.