

STELLINGEN

I

Bij onverklaarde hypochrome anemieën dient aan bloedverlies ten behoeve van laboratoriumonderzoek te worden gedacht.

II

Juist de wetenschappelijke reclamemethodes van de farmaceutische industrie dienen de medicus te manen tot de grootste waakzaamheid bij het beproeven van nieuwe farmaca.

III

Bij het behandelen van neusbloedingen dient men zich steeds bewust te zijn van het mogelijk symptomatisch karakter ervan.

IV

Het streven naar het behoud van de benige gehoorgangsachterwand bij de tympanoplastiek brengt zowel de aangezichtszenuw als de radicaliteit van de operatie onnodig in gevaar.

V

De status asthmaticus en de status epilepticus dienen mede door de anaesthesist beoordeeld en behandeld te worden.

VI

Het verdient aanbeveling physico-therapeuten te oefenen in het gebruik van de stethoscoop.

VII

Bij de behandeling van patiënten die lijden aan een ziekte met een infauste prognose dient de nadruk gelegd te worden op verlichting van het lijden, ook ten koste van verlenging van het leven.

VIII

Bij het stellen van de indicatie tot medisch ingrijpen bij kinderen dient de emotionele instelling van de ouders in de overwegingen te worden betrokken.

IX

Het zoeken naar krachtige analgetica die niet tot verslaving zouden kunnen leiden is vruchteloos.

X

De conceptie van de zondeval staat de arbeidsvreugde in de weg.