

Stellingen

1. Er bestaan verschillende, door meer dan een gen veroorzaakte erfelijke dystrofieën van de fovea. Om deze reden dient de term „heredo-degeneratie van de macula” verworpen te worden.
2. Indeling van de erfelijke dystrofieën van de achterpool van het oog op basis van de leeftijd waarop de dystrofie zich manifesteert, is onjuist.
3. Bij het onderzoek van de erfelijke dystrofieën van de achterpool van het oog is de electro-oculografie als onderzoekingsmethode van even groot belang als de electro-retinografie.
4. De stelling van Elwyn, dat er geen erfelijke dystrofieën zijn, die zich primair in het retinale pigment epitheel ontwikkelen is onjuist. (Elwyn, Arch. Ophthal, 1955, 53, 619).
5. Fovea-lesies ten gevolge van kijken in de zon komen in het algemeen en bij de bevolking van een psychiatrische inrichting in het bijzonder meer voor dan gewoonlijk wordt aangenomen.
6. Wanneer bij een neuritis retrobulbaris geen remissies optreden moet deze diagnose ten sterkste betwijfeld worden.
7. Wanneer men bij een kind een ectopia lentis vindt moet men denken aan de mogelijkheid van homocystinurie.
8. Aangezien fruit veel koolhydraten bevat dient het gebruik hiervan door diabetici sterk gelimiteerd te zijn.

9. Indien een oogheelkundige ingreep onder algemene anaesthesie wordt uitgevoerd, is het injiceren van een lokaal anaestheticum in de retrobulbaire ruimte overbodig.
10. Men opereert een congenitale rubeola-cataract niet voor het eerste levensjaar.
11. Er is nog onvoldoende bekend over de hereditaire vitreo-retinale dystrofieën.
12. Bij voorzichtige indicatiestelling en adequate operatietechniek is de intra-oculaire kunstlens als een grote aanwinst voor de oogheelkunde te beschouwen.
13. Op dit moment lijkt de trabeculotomia ab externo de aangewezen operatie te zijn bij patiënten met glaucoom ten gevolge van goniodysgenesis.
14. Klinische differentiatie van een klein maligne melanoom en een naevus van de chorioidea is bij eenmalig onderzoek niet mogelijk.
15. Men realiseert zich onvoldoende, dat de optimale gezichtsscherpte bij jonge volwassenen aanzienlijk meer is dan overeenkomt met een gezichtshoek van 1 minuut (1.0 Snellen).
16. Eenzijdige opticus atrofie gecombineerd met contralateraal papiloedeem (Foster Kennedy) wordt in een aanzienlijk aantal der gevallen niet veroorzaakt door een tumor cerebri.
17. Uhthoff's symptoom kan een hulpmiddel zijn om tot de diagnose neuropathie van de nervus opticus bij sclerosis multiplex te komen. (Goldstein, Peczon and Cogan, Arch. Ophthal. 1965, 74, 175).
18. Photocoagulatie is op dit moment de behandeling, die de meest gunstige invloed lijkt te hebben op het beloop van de diabetische retinopathie.
19. Er behoeft geen nadelige invloed uit te gaan van het formeren van een vrienden-elftal in een grote hockeyvereniging als Victoria of Leiden.
20. De internationale marktwaarde van Cruyff is gedaald na zijn optreden in de benefietwedstrijd voor Coluna.
21. Veel ogen kunnen behouden blijven, indien veiligheidsglas voor auto's onmiddellijk verplicht wordt gesteld en indien kinderen niet meer op de voorbank van auto's vervoerd worden.