

## STELLINGEN

### I

Hemodialyse is aangewezen in gevallen van ernstige geneesmiddelenvergiftiging, zelfs als het causale agens nog onbekend is.

### II

Orale toediening van koolstof is een onbruikbaar en soms gevaarlijk middel bij de behandeling van patienten met chronische nierinsufficiëntie.

### III

De rol van de psychiater is tijdens de hemodialyseperiode belangrijker dan bij de beoordeling die aan de dialyse voorafgaat.

### IV

Het feit dat een geneesmiddel niet door de nieren wordt uitgescheiden is nog geen reden dit middel aan patienten met een nierinsufficiëntie voor te schrijven.

### V

Het aangeven van de concentratie van serumcalcium en -magnesium in (milli)molen is niet in overeenstemming met het fysiologisch gedrag van deze stoffen.

### VI

Aanwijzingen voor toenemende leverbeschadiging vormen bij een lijder aan colitis ulcerosa een dwingende indicatie voor totale colectomie.

### VII

Het nuttig profylactisch effect van een maandelijks injectie benzathine-penicilline t.a.v. streptococceninfecties houdt geen verband met een werkzame serumspiegel gedurende deze gehele periode.

## VIII

Een prospectief onderzoek naar de levensduur van getransfundeerde ABO- RhD compatibele erythrocyten in gevallen van primotransfusies bij mannen, samen met het ontstaan van anti-erythrocytaire antilichamen is in hoge mate gewenst.

## IX

Indien na heelkundige ingrepen voldoende orale voeding niet spoedig mogelijk is, is calorisch adaequate intraveneuze voeding geïndiceerd.

## X

De meting van de duur van de Achillespeesreflex heeft slechts waarde als men de temperatuur van de kuitspier in aanmerking neemt.

## XI

Het adverteren van fenacetinehoudende analgetica via de publiciteitsmedia is ongeoorloofd.