

## STELLINGEN

### I

De stijging van het Hb-gehalte in het perifere bloed tijdens de adrenalineproef vormt een maatstaf voor de hoeveelheid en voor de concentratie van de erythrocyten in de milt.

### II

In een vergrote, goed haemoconcentrerende milt heeft een inhomogene menging plaats van zojuist toegediende erythrocyten.

### III

De stijging van het Hb-gehalte in het perifere bloed tijdens de adrenalineproef is een belangrijk criterium voor de indicatie tot splenectomie bij patiënten met verhoogde bloedafbraak.

### IV

De kortdurende sterke stijging van de thrombocyten na een splenectomie is niet het gevolg van een verhoogde productie van thrombocyten, maar van een tijdelijk verminderde afbraak hiervan.

### V

De totale colectomie met terminale ileostomie verdient bij een operatie voor een colitis ulcerosa de voorkeur boven een ileorectale anastomose.

Halter, F. (1968) Schweiz. Med. Wchnschr. 98, 41, 1592.

### VI

Een patiënt met een ulcus ventriculi, dat na een lege artis uitgevoerde rustkuur van 4 weken nog röntgenologisch of gastroscopisch zichtbaar is, dient een maagresectie te ondergaan.

Gill, A. (1968) Brit. Med. Journal 5615, 415.

### VII

Patiënten lijdende aan levercirrhose met röntgenologisch aantoonbare oesophagusvarices komen niet in aanmerking voor een prophylactische operatie met portocavale shunt.

Resnick, R. H. e.a. (1969) Ann. Intern. Med. 70, 675.

### VIII

Halothane veroorzaakt een ernstige stijging van de intracranieële druk bij patiënten met een ruimte-innemend proces in cerebro, hetgeen tot moeilijkheden bij de operatie kan leiden.

The Lancet I, 61 (1969).

## IX

Bij een aantal patiënten met myotonie worden de abnormale contracties van de skeletspieren niet opgewekt door kalium, maar door een andere humorale substantie, die in de spieren zelf ontstaat.

## X

De diagnose hyperparathyreoidie wordt mede gesteld op de locale stijging van het serum calcium tijdens de stuwproef met handcontracties.

## XI

Een verminderde uitscheiding van magnesium t.o.v. calcium in de urine is een factor in de vorming van calciumhoudende nierstenen.

## XII

De meting van de zenuwgeleidingstijd is van belang voor de diagnostiek van patiënten met levercirrhose.

## XIII

Bij patiënten met cardiale ritmestoornissen representeren veranderingen in echopulsaties gelijktijdige veranderingen in slagvolume.

## XIV

Bij de opleiding tot internist dient een stage van minimaal 9 maanden op de afdeling Heelkunde verplicht te zijn.

G. H. Krull

Rotterdam, 26 juni 1969.