

Von Willebrand Disease in the Netherlands

- 1) Het type Von Willebrand ziekte en lage VWF/FVIII levels zijn geassocieerd met een ernstiger bloedingsfenotype in patiënten met matig-ernstige en ernstige ziekte van Von Willebrand (dit proefschrift).
- 2) Vrouwen met matig-ernstige of ernstige ziekte van Von Willebrand ondergaan vaker een uterus extirpatie dan vrouwen met chronische menorrhagie zonder de ziekte van Von Willebrand (dit proefschrift).
- 3) Matig-ernstige of ernstige ziekte van Von Willebrand leidt niet tot een lager kindertal (dit proefschrift).
- 4) Hyperfibrinolyse leidt niet tot een toegenomen bloedingsfenotype in patiënten met de ziekte van Von Willebrand (dit proefschrift).
- 5) Het bloedingsfenotype van zowel volwassenen als kinderen met de ziekte van Von Willebrand is sterk geassocieerd met kwaliteit van leven (dit proefschrift).
- 6) The quality of life is more important than life itself (A. Carrel).
- 7) De anekdotische meldingen van een toegenomen bloedingsneiging bij rood harige vrouwen lijken niet te berusten op onderliggende afwijkingen van de hemostase (E.B. Liem et.al. *Anesth Analg.* 2006;102(1):313-8).
- 8) Niet alleen bij mensen, maar ook bij honden is een bloedingscore vragenlijst zinvol in de diagnostiek van de ziekte van Von Willebrand (H.J. Burgess et.al. *Can J Vet Res.* 2009;73(4):241-51).
- 9) Biomedical research is so important that there is a positive moral obligation to pursue it and to participate in it (J. Harris, *J.Med Ethics* 2005;31:242-8).
- 10) External beam radiotherapy can be considered for hemophilic patients in developing countries, external beam radiotherapy decreases intra-articular bleeding frequency in hemophilic arthritis patients with minimal complications (M. Kong et.al. *J Korean Med Sci.* 2010 dec;25(12):1742-7).
- 11) Het parkeerbeleid van het Erasmus MC heeft er mogelijk toe geleid dat de diagnose ziekte van Von Willebrand minder vaak is gesteld in Rotterdam.