

STELLINGEN

I

Voor het aantonen van snelle veranderingen in de nierdoorbloeding bij de mens is de $^{133}\text{Xenon}$ uitwas methode superieur aan andere onderzoeksmethoden.

II

Chronische intermitterende peritoneaal-dialyse is een aanvaardbare nierfunctievervangende behandeling als haemodialyse op bezwaren stuit.

III

De plasma renineconcentratie geeft informatie over de prognose van patiënten met essentiële hypertensie mits hun haemodynamische status bij de overwegingen wordt betrokken.

IV

Locale — profylactische — radiotherapie na operatie wegens mammapcarcinoom draagt wellicht bij aan het manifest worden van metastasering op afstand.

V

Er is geen causaal verband tussen het toedienen van bijnierschors-hormonen en het ontstaan van peptische ulcera.

VI

Wetenschappers die meer dan eenmaal wensen te promoveren verdienen een intensief psychologisch onderzoek.

VII

"Thuisdialyse" zal alleen dan een fundamentele rol kunnen spelen bij het oplossen van de vraag naar meer dialyseplaatsen, als een overkoepelende organisatie de afwikkeling van de financiële vraagstukken van de patiënten van de opleidingscentra overneemt.

VIII

De ratio amylase-/creatinine klaring is van grotere waarde voor het stellen van de diagnose acute pancreatitis dan de bepaling van de amylase concentratie in plasma en/of urine.

IX

Bij de behandeling van hypercalcaemie door maligne aandoeningen moet een plaats worden ingeruimd voor stoffen die de prostaglandinesynthese remmen.

X

Het toevoegen van stellingen aan een proefschrift zal vooral door het heffen van auteursrechten op de laatste stelling betekenis kunnen krijgen.

XI

De relatie tussen de beide ziekenhuizen in Zwolle kan enigszins worden vergeleken met het optreden van de muziekkorpsen in de film "Fanfare" van Bert Haanstra.