

STELLINGEN

1. Bij een acute afstoting van de getransplanteerde lever moet men vermijden immunosuppressiva te gebruiken, die voor hun werking afhankelijk zijn van een goede leverfunctie, of de leverfunctie in ongunstige zin beïnvloeden.
2. Verder dier-experimenteel onderzoek is noodzakelijk, voordat men patienten reëel een kans van 25% op 3 jaarsoverleving na levertransplantatie kan bieden.
3. Een beter onderscheid in vorm en verpakking van suppositoria bestemd voor kinderen en die voor volwassenen is noodzakelijk.
4. Bij de behandeling van een patient met een ernstige theophylline-intoxicatie dient in een vroeg stadium haemodialyse overwogen te worden.
5. De behandeling van een door koorts uitgelokte, ernstige melkzuuracidose bij een patient met glucose-6-phosphatase deficiëntie, moet gericht zijn op een snelle correctie (binnen twee uur) van 1½ maal het basetekort.
6. De veronderstelling dat er tijdelijk een deficiënte werking van een van de ureumcyclus enzymen bestaat bij kinderen met het syndroom van Reye, vormt een aantrekkelijke werkhypothese.
M.M. Thaler 1975 Pediatrics 56: 1081
7. Hypertensie is de meest voorkomende complicatie na het doormaken van een Haemolytisch Uraemisch Syndroom.
C.A. Gianantonio et al. 1973 Nephron 11: 174; J.J.M. van Collenburg, persoonlijke mededeling

8. Bij patiënten met een nefrotisch syndroom is, ter verduidelijking van dit beeld, diagnostiek gericht op het aantonen van circulerende immuuncomplexen noodzakelijk.
9. Immunofluorescentie onderzoek van patiënten granulocyten enerzijds en incubatie van patiënten serum met normale donor granulocyten anderzijds, kan een bijdrage leveren tot de diagnostiek van circulerende immuuncomplexen.

J.W. Steffelaar et al. 1976 Clin. Exp. Immunol. 23: 272

10. Bij de behandeling van een Pneumocystis Carinii infectie verdient Trimethoprim-Sulfamethoxazole de voorkeur boven Pentamidine.
11. De initiële behandeling van congenitale hypothyreoidie dient snel, met opklimmende doses tri-iodothyronine, onder intensieve bewaking te geschieden.
12. Indien een ernstige zieke pasgeborene naar een centrum voor neonatale zorg moet worden verwezen, dient niet het kind snel naar het centrum te worden vervoerd, maar de hulpbiedende instantie naar het kind.
13. De toepassing van de snek en van het anker echappement heeft de waarneming van de tijd met grotere stappen vooruit gebracht dan de toepassing van het kwarts kristal.

Rotterdam, 9 juni 1976

E.D. Wolff