

STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift "Foetale Nierfunctie"
van L.C. van Otterlo.

1. De echoscopische methode om de foetale urineproductie bij de mens te meten is betrouwbaar.
2. De in vergelijking met de neonatus hogere urineproductie van de menselijke foetus wordt veroorzaakt door een lagere tubulaire terugresorptie van water.
3. De nierfunctie van de humane foetus wordt door het proces van de baring niet beïnvloed.
4. Polyhydramnion wordt niet veroorzaakt door een verhoogde foetale urineproductie.
5. In de statistieken van de perinatale morbiditeit en mortaliteit in Nederland dient onderscheid te worden gemaakt tussen de groep autochtone Nederlanders en de buitenlandse bevolkingsgroepen.
6. Steeds aandacht vragen voor een optimale begeleiding van ernstig zieken en stervenden kan niet altijd worden gelijkgesteld met klagen over een gebrek eraan.
7. Na een partus immaturus of praematurus kan door middel van echoscopie in het puerperium al een onderzoek worden gedaan naar het bestaan van een uterusanomalie.
8. De onzekerheid over de identiteit van de huisarts moet worden weggenomen door een bewuste beperking van zijn taak. Deze taak dient vooral gebaseerd te zijn op een grondige kennis op somatisch terrein. Dit zal met name in de eerstelijns samenwerkingsverbanden kunnen worden gerealiseerd.

9. Een verhoging van de concentratie van alpha-foetoproteïne in het vruchtwater in het tweede trimester van de zwangerschap kan behalve op een defect van de neurale buis ook wijzen op een foetaal nefrotisch syndroom of een afsluiting van de foetale tractus digestivus.
10. Het eisen van recht op een onbeperkte preventieve en therapeutische gezondheidszorg eist als tegenprestatie een gematigd leven.
11. Het is onjuist het mammacarcinoom als een locale aandoening te behandelen. Naast chirurgische therapie behoort een behandeling met chemotherapeutica te worden overwogen.
12. Amnioscopie als methode voor "hoeding" van de zwangerschap is onvoldoende betrouwbaar en behoort daarom niet meer te worden toegepast.
13. Aan de resultaten van het biochemisch onderzoek van de placentafunctie kan slechts beperkte betekenis worden toegekend, die niet kan worden vergroot door in plaats van één test meerdere tests met geringe betrouwbaarheid toe te passen.
14. Hysterectomie dient nimmer te worden uitgevoerd uitsluitend op grond van sterilisatiewens van de vrouw.
15. Het afschaffen van het eenhoofdig opleiderschap zal een ernstige aantasting betekenen van de thans nog tussen opleider en assistent-in-opleiding bestaande vader - kind verhouding.