

Stellingen

Behorende bij het proefschrift:

'Motility and Endosonographic Studies in Patients with Anorectal Disorders'

1. Het meten van de rectale viscerale sensitiviteit en compliantie kan klinische consequenties hebben. *Dit proefschrift*
2. Vermindering of afwezigheid van de postprandiale rectale tonus respons bij vrouwen die een partus hebben doorgemaakt, kan wijzen op neurogene schade aan het rectum. *Dit proefschrift*
3. Stoornissen in de rectale viscerale sensitiviteit of compliantie worden gevonden bij 90% van de patiënten met idiopathische obstipatie. *Dit proefschrift*
4. Bij patiënten met een rectocele is niet de rectale functie maar de ernst van de aan prolaps-gerelateerde klachten voorspellend voor het postoperatieve resultaat. *Dit proefschrift*
5. De anatomie van recidief cryptoglandulaire fistula-in-ano en van fistula-in-ano geassocieerd met de ziekte van Crohn moet gevisualiseerd worden alvorens tot behandeling over te gaan. *Dit proefschrift*
6. Bij boterhamzakjes bestaat een duidelijke prijs-kwaliteit-verhouding: hoe duurder, hoe meer druk kan worden gegeven voordat ze ploffen.
7. Van het rectum is, in tegenstelling tot de aborale begrenzing, de orale begrenzing een discussiepunt.
8. Voor de samenwerking tussen de gastro-intestinale chirurg en de maag-darm-lever arts zou een orgaansysteem specifieke indeling meer op zijn plaats zijn dan de indeling snijdend-niet snijdend.
9. Het is niet het gestuurd toetsen van een hypothese welke de meest opzienbarende wetenschap heeft opgeleverd maar echter het observeren van een toevalligheid.
10. Als barron ligatie, drie pijler hemorroidectomie of de Longo procedure onvoldoende resultaat oplevert, kunnen patiënten altijd nog hun aambeien tonen aan Sint Gonçalo en bidden voor genezing.
11. Niet het kunnen maar het kunnen leren geeft de meeste voldoening.

C.E.J. Sloots, 9 april 2003