

S T E L L I N G E N

I

Bij lymphocyttaire en histiocyttaire maligne lymphomen is de aanwezigheid van constitutionele symptomen een van het klinisch stadium onafhankelijke prognostische factor.

Dit proefschrift, hfst. IX

II

Bij de radiotherapie van lymphocyttaire en histiocyttaire maligne lymphomen in een klinisch stadium III, waarbij de mediastinale klieren niet zijn aangedaan, kan bestraling van het mediastinum achterwege blijven.

Dit proefschrift, hfst. X

III

De vermindering van de granulocyten functie bij diabetes mellitus wordt niet veroorzaakt door hyperglycaemie.

Bagdade, J.D. et al. (1974); Diabetes 23, 1:9-16.
Tan, J.S. et al. (1975); J. Lab. Clin. Med. 85, 1:26-34.

IV

Bij het instellen van immuunsuppressieve therapie moet men rekening houden met het oncogeen effect hiervan.

Steigbigel, R.T. et al. (1974); Arch. Int. Med. 134:728-731
Silvergleid, A.J. et al. (1974); Ann. J. Med. 57:885-889

V

Vinca-alkaloiden stimuleren de stamceldifferentiatie in de megakaryocytaire richting.

Klener, P. et al. (1974); Sc. J. Haem. 12: 179-184

VI

Bij persisterende klachten na een cholecystectomie is een proefkuur met metoclopramide zinvol.

Johnson, A. G. (1975); Ann. R. C. Surg. Engl. 56: 69-81

VII

De bestudering van koolhydraat-malabsorptie wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door meting van het waterstof gehalte in de uitademingslucht na orale koolhydraat belasting.

Hepner, G. W. (1974); Gastroenter. 67: 1250-1256

VIII

De tijd, die een vrouw aan het huishouden besteedt, is niet verkort door de moderne technische hulpmiddelen.

Vanek, J. (1974); Sc. Ann: November: 116-120

Stellingen behorende bij het proefschrift van J. M. M. P. M. van Turnhout

Rotterdam, 9 april 1975.