

## STELLINGEN

### I

Er is bij vroege syfilis sprake van een preferente synthese van basisch IgG (dit proefschrift)

### II

De toename van het gehalte aan basisch IgG in sera van syfilispatiënten speelt een belangrijke rol bij de verhoging van de thymoltroebeling van deze sera (dit proefschrift).

### III

De IgM verhoging in het serum van patiënten met vroege syfilis is relatief sterker en houdt langer aan dan de IgA en IgG verhoging (dit proefschrift).

### IV

Het is met het oog op de volksgezondheid wenselijk de thans in de streeklaboratoria in Nederland in gebruik zijnde serologische screening op syfilis, waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van de relatief ongevoelige en onspecifieke cardiolipine reakties, aan te passen aan moderne inzichten betreffende de syfilisserologie.

### V

Door het Stuart transportmedium in een N<sub>2</sub> bevattende, gesloten ampul te plaatsen, wordt de houdbaarheid aanzienlijk vergroot, hetgeen een waardevolle aanwinst vormt voor de gonococendiagnostiek in de periferie (Kallings, 1968).

### VI

Het opsporen van met antilichamen "gecoate" bacteriën in het arinesediment, met behulp van de fluorescentiemicroscopie, lijkt een belangrijke aanwinst voor het vaststellen van de lokalisatie van de infectie (Thomas et al., N.Engl.J.Med. 1974, 588).  
(Jones et al., N.Engl.J.Med. 1974, 591).

## VII

Mogelijk is het vivonexdieet vanwege de goed gedefinieerde en betrekkelijk allergeenarme samenstelling te gebruiken bij de diagnostiek van voedingsallergieën.

## VIII

Het scheppen van de mogelijkheid tot het bezoeken van speciaal daarvoor aangewezen poliklinieken voor geslachtsziekten zonder verwijskaart hoeft geen inbreuk te betekenen op de relatie tussen huisarts en patient.

## IX

Bij vrouwen die onderzocht worden op seksueel overdraagbare ziekten, dient als routine een onderzoek op het aanwezig zijn van een maligne aandoening in het genitaal gebied verricht te worden.

## X

De granuloomvorming bij tertiaire syfilis hangt waarschijnlijk samen met het persisteren van *Treponema pallidum* of treponemale resten.

## XI

Het feit dat de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen via verschillende kanalen loopt is niet efficient.

H. E. Menke.

Rotterdam, 11-6-1975.