

Stellingen

- I De opvatting, dat bij onderbeenfracturen met ernstige weke-delenletsels een anatomische repositie en fixatie binnen enkele uren na het ongeval de kans op infectieuze complicaties verhoogt, is onjuist.
- II De onderbeenfractuur met ernstige weke-delenletsels is een indicatie voor primaire repositie en fixatie met de fixateur externe.
- III Routine-matige behandeling van alle typen tibia-schachtfracturen is mogelijk met de fixateur externe.
- IV Bij patiënten met multiple letsels is het hersenletsel niet altijd een contra-indicatie voor operatieve fixatie van bepaalde fracturen.
- V Het voor botsintigrafie meest geschikte radiofarmacon is op dit moment ^{99m} technetium-pyrofosfaat.
Krishnamurthy, G.T. Journ. Nucl. med., 16, 109. 1975.
- VI Het ^{99m} technetium-bleomycine is onbruikbaar voor het opsporen van longtumoren.

- VII Bij de behandeling van patiënten met kanker is de bestrijding van metastasering het centrale klinische probleem.
- Hellmann, K. Recent developments in adjuvant chemotherapy. Symposium, Negende Oncologie Bijeenkomst, Amsterdam 1975.
- VIII Grootscheeps bevolkingsonderzoek op hartvaatziekten met het doel deze ziekten te bestrijden is op dit moment niet rationeel.
- Sackett, D.L. Cardiovascular diseases. The Lancet., 7890, 1189. 1974.
- IX Het verdient aanbeveling in de opleiding tot orthopaedisch chirurg meer aandacht te besteden aan de handchirurgie.
- X Bij de kwaliteitsbewaking van het medisch handelen behoort niet het toezicht, maar de voortdurende bijscholing van de arts, het primaire doel te zijn.
- Casparie, A.F. Ned. T. Geneesk., 119, 667. 1975.