

STELLINGEN

1. De in de literatuur vaak veronachtzaamde 'tweede potentiaal' vormt een essentieel onderdeel van het gastro-elektromyografische signaal.
2. De afwijking van de elektrische activiteit van het antrum die door O'Leary en Hennessy (1977) werd beschreven als retrograad naar het antrum voortgeplante duodenum-activiteit, vertoont alle kenmerken van een tachygastrie.
(O'Leary, J.F. en T.P. Hennessy; J.Surg.Res. 23; 161-165, 1977)
3. Bij patiënten met een onbegrepen maagretentie dient elektrogastrografisch onderzoek naar het bestaan van een tachygastrie te geschieden.
4. De misvatting dat fasische maagspiercontracties uitsluitend in relatie met spikes optreden, berust voor een belangrijk deel op het naar de maag transponeren van bij onderzoek aan de dunne darm verkregen resultaten.
5. Door de ontdekking van de secretoire component van het interdigestieve complex moeten vraagtekens worden gezet bij de uitkomsten van veel vroegere onderzoeken naar secretieprocessen in het maagdarmkanaal.
6. Aangezien wetenschappelijke modellen slechts zijn bedoeld als hulpmiddelen bij het verwerven van inzicht in de te onderzoeken werkelijkheid, dient te worden vermeden dat modelvorming doel op zich wordt.
7. Bij de instructie van elementaire cardiopulmonale resuscitatie-handelingen aan leken wordt het belang van een zorgvuldig onderricht in de uitvoering van de reanimatie-technieken nog overtroffen door het belang van een zorgvuldig onderricht in diagnostiek en indicatiestelling.

8. Meetgegevens welke een computer hebben doorlopen, worden vaak ten onrechte als betrouwbaarder beoordeeld dan meetgegevens die een dergelijke weg niet hebben afgelegd.

9. Closetpotten die dusdanig zijn geconstrueerd dat inspectie van de erin gedeponeerde excreta onmogelijk is, vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

10. Fotokopiëren is niet hetzelfde als lezen.