

STELLINGEN

1. Tc^{99m} -DTPA nierscanningonderzoek is een geschikte methode om bij (jonge) kinderen de procentuele gescheiden nierfunctie te meten en niergrootte te bepalen.
2. In veel gevallen kan bij controle na een urologische ingreep beter gebruik gemaakt worden van een DTPA scan dan van een IVP; de onderzoeker krijgt dan goede informatie en de patient aanzienlijk minder stralenbelasting.
3. De kracht van de nucleaire geneeskunde schuilt in functie-onderzoeken; de zwakheid zowel als de sterkte ervan in de beeldvorming.
(Ephraïm, 1978)
4. De endogene creatinine clearance is in theorie een goede, doch in de praktijk, vooral op de kinderleeftijd, een zeer onbetrouwbare nierfunctie-onderzoek methode.
5. Nefrotisch syndroom op de kinderleeftijd kan in veel gevallen poliklinisch behandeld worden.
6. Haemodialyse- en niertransplantatiebehandeling bij jonge kinderen hoort zo mogelijk thuis in een kindernefrologisch centrum; helaas ontbreekt in de noordelijke provincies een dergelijk centrum (nog).
7. Er zijn zeer vele classificaties van cystenieren; een goede is die, waarbij naast klinische en morfologische ook rekening gehouden wordt met genetische aspecten.
8. "De" oorzaak voor SIDS(=sudden infant death syndrome), ook wel acute wiegedood genoemd, is nog altijd onbekend; mogelijk is het zo, dat acute wiegedood het resultaat is van het samengaan van veel kleine oorzaken.

(Huber, 1979)

9. Ieder beginnend assistent kindergeneeskunde dient de voor (a.s.) kinder-artsen georganiseerde cursus gesprekstechniek te volgen; de (a.s.) kinder-arts leert dan vooral goed te luisteren.
10. In het postgraduate onderwijs in de kindergeneeskunde dient in toenemende mate aandacht te worden besteed aan "feed back" over en weer - dit geldt zowel voor de georganiseerde cursussen als voor het meer individuele contact, ook wel consultatie genoemd.
11. Indien bij radicale operatie wegens mammacarcinoom okselklier-metastasering aanwezig blijkt te zijn, verdient bij positieve uitslag van de oestrogeenreceptortest van het tumorweefsel (z.g. adjuvant) hormonale therapie de voorkeur boven chemotherapie.
12. Screeningsonderzoeken in het kader van preventieve gezondheidszorg zullen aanmerkelijk effectiever zijn, indien deze stoelen op curatieve ervaring.
13. Het eventueel (mogen) oprichten van een I.C.U.P. (= intensive care unit voor pasgeborenen) in een niet-universitair centrum heeft meer voeten in de aarde dan het alleen maar bezien, of er voldoende ruimte, materiële voorzieningen, personeel en "know how" bestaan.
14. Het uitoefenen van een subspecialisme is óók mogelijk in een niet-universitaire (kinderartsen)praktijk, mits men werkzaam is in een groep met goede onderlinge samenwerking en men de beschikking heeft over voldoende faciliteiten.
15. Het zou een goede zaak zijn, wanneer de medische staven van de Zwolse ziekenhuizen zouden worden uitgebreid met meer vrouwelijke specialisten.