

Stellingen

1. De incidentie van foetale adembewegingen is door veranderingen in de maternale gaswisseling te beïnvloeden.
2. De reactie van de foetale ademincidentie op veranderingen in de maternale gaswisseling in de ongestoorde zwangerschap verschilt niet van die bij de in groei achtergebleven foetus.
3. De incidentie van foetale adembewegingen is bij de in groei achtergebleven foetus lager dan in de ongestoorde zwangerschap.
4. In de opleiding tot vrouwenarts dient een stage echografie aanwezig te zijn.
5. De biofysische bewaking van het ongeboren kind verdient verre de voorkeur boven de biochemische bewaking.
6. Aangezien de bewaking van het ongeboren kind een onmisbaar onderdeel van de prenatale zorg vormt, dient een adequate kostenvergoeding te worden gerealiseerd.
7. Het langdurig gebroken zijn van de vliezen doet de kans op hyaliene-membranenziekte niet verminderen.
8. Indien tijdens de behandeling van eclampsie longoedeem ontstaat, verdient het aanbeveling pulmonalisdrukmetingen te verrichten, gecombineerd met colloid osmotische drukk bepalingen.
9. Electrohysterografie is niets anders dan een weergave van de mechanische activiteit van de uterus.
10. Indien een testikel na het twaalfde jaar niet is ingedaald, dient om oncologische redenen geen orchidopexie, doch een orchidectomie plaats te vinden.
11. De behoefte aan eigen patiënten berust ten dele op een gebrek aan eigen identiteit van de specialist in opleiding.
12. Een goed gynaeco-loog dient tevens een goed gyn-oecoloog te zijn.

H. K. van Weering, 13 juni 1980.