

STELLINGEN

1. Verwijdering van de submandibulaire speekselklieren heeft bij de muis een verandering in de gewichtstoename tot gevolg.
2. Speeksel geproduceerd in de submandibulaire speekselklieren bevordert de wondgenezing van de muis.
3. Nerve Growth Factor lokaal in de maag toegediend bevordert het ontstaan van stress ulcera bij de muis.
4. Verwijdering van de submandibulaire speekselklieren vermindert het aantal chemisch geïnduceerde colontumoren bij de muis.
5. Door het aanleggen van een naald-jejunostomie bij grote bovenbuikschirurgie kan direkt post-operatief enteraal gevoed worden.
6. Bij de behandeling van patiënten met een hypovolaemische shock tengevolge van bekentraumata of chirurgisch niet te behandelen abdominale bloedingen is de "MAST" (Medical Anti-Shock Trousers) een "MUST".
7. Een pancreas-pseudocyste groter dan 4 cm die binnen 6 weken na ontstaan niet kleiner wordt, dient inwendig gedraineerd te worden.
8. Bij de Ziekte van Scheuermann in de actieve fase, is topsport, die gepaard gaat met zware belasting van de wervelkolom, af te raden.
9. Centraal Veneuze Druk meting kan zowel elektronisch als manometrisch geschieden, de elektronische meting verdient echter de voorkeur.
10. Eerste- en tweede-graads hemorroiden zijn op eenvoudige wijze poliklinisch, zonder enige vorm van anaesthesie te behandelen door middel van scleroserende injecties of ligeren met behulp van rubberen bandjes.

11. De gevaarlijkste aanval in het hockeyspel blijft de aanval over de rechtervleugel.
12. De zinspreuk "Helpt Elkander Blijft Eendrachtig" is ook in de chirurgische opleiding van toepassing.

*Stellingen behorend bij het
proefschrift van
M. Eeftinck Schattenkerk*

Rotterdam, 5 juni 1981