

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift:

HYPERANDROGENISME BIJ DE VROUW

J.M.G. Hollanders

I

Door het bepalen van de afzonderlijke frakties der 17-ketosteroiden in 24-uurs urine kan men vaker de diagnose hyperandrogenisme stellen dan door het bepalen van de plasmakoncentratie van testosteron.

(Dit proefschrift)

II

Anovulatie als gevolg van hyperandrogenisme gaat niet altijd gepaard met hirsutisme en acne.

(Dit proefschrift)

III

Bij de behandeling van anovulatie bij patienten met functioneel primair hyperandrogenisme dient men een belangrijke plaats in te ruimen voor glucocorticoiden.

(Dit proefschrift)

IV

Deskundig verricht diathermisch epilieren van patienten met hirsutisme is een waardevolle therapie van één der symptomen van hyperandrogenisme en dient derhalve in het pakket ziektekostenvergoedingen te worden opgenomen.

(Dit proefschrift)

V

De post-ovulatoire daling van de ovariële oestradiolproduktie is (mede) het gevolg van een inhibitie van enzym-aktiviteiten betrokken bij de produktie van ovariële androgenen.

*Leung, P.C.K. en Armstrong, D.T.:
Biol. Reprod. 21: 1025-1042 (1979).*

VI

Het vinden van een sluitend mathematisch model voor een biologisch regelmechanisme sluit niet uit, dat ook onbekende factoren een rol spelen in dit mechanisme.

*Schwartz, N.B.:
Rec. Progr. Horm. Res. 25: 1-55 (1969).*

*Schwartz, N.B. en Channing, C.P.:
Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 74:
5721-5724 (1977).*

VII

Curettagage is als routinematige handeling ter uitsluiting of bevestiging van de diagnose extra-uteriene graviditeit niet toelaatbaar.

*Hollanders, J.M.G. en Schellekens, L.A.:
Ned. T. Geneesk. 124: 257-260 (1980).*

VIII

Het verrichten van hysterectomie tegelijk met het instellen van chemotherapie bij patienten met trophoblasttumoren, kan tot een belangrijke reductie van de voor het verkrijgen van een remissie noodzakelijke hoeveelheid chemotherapeutica leiden.

*Hammond, C.B.; Weed; J.C. en Currie, J.L.:
Am. J. Obstet. Gynecol. 136: 844-858 (1980).*

IX

Het vinden van een hypertensieve fundus oculi stadium II volgens de indeling van Keith, Barker en Wagener bij een gravida wijst op het bestaan van een hypertensie daterend van vóór de graviditeit.

*Keith, N.M.; Barker, N.W. en Wagener, H.P.:
Amer. J. Med. Sci. 197: 323-333 (1939).*

X

Gezien vanuit de psychosomatische eenheid van de mens dient de psychologie voor een gynaecoloog(-oge) een belangrijke wetenschap zijn.

XI

Sigmund Freud's stelling (1893), dat de man die zijn vijand als eerste een scheldwoord toeriep in plaats van een speer de grondlegger was van de civilisatie, is voor discussie vatbaar.

XII

Het vermelden alsook het nadrukkelijk afzien van vermelding van de eigen academische titel(s) zijn verschillende uitingsvormen van identieke psychologische mechanismen.

XIII

De opkomst van verschijnselen als vrouwenhuis en vrouwencafé staat in een dialektische relatie tot de beklemtoning van de gelijkheid van man en vrouw.

XIV

De mogelijke voor- en nadelen voor de patient die gebruik wil maken van het recht de eigen status morbi in te zien, zullen aanzienlijk worden beperkt door de geringe leesbaarheid van het handschrift van de medikus.

XV

De in de Engelstalige literatuur gebruikte uitdrukking 'cycling women' kan op verschillende wijzen worden verstaan.