

## STELLINGEN

1. De mate van bronchiale prikkelbaarheid bepaalt in belangrijke mate de kans op en de ernst van symptomen van de luchtwegen. (Dit proefschrift)
2. Bij toegenomen bronchiale prikkelbaarheid bestaat een regelstoornis van de luchtwegen, waarbij verschillende systemen, zowel in als buiten de bronchi, betrokken kunnen zijn. (Dit proefschrift)
3. Het meten van de bronchiale reactie na inspanning is een eenvoudige, voor vele kinderen acceptabele test ter beoordeling van bronchiale prikkelbaarheid. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van potentieel toxische agentia. (Dit proefschrift)
4. Het bronchus epitheel (mucosa) heeft een belangrijke rol bij de invloed van en de verdediging tegen exogene factoren. (Dit proefschrift)
5. Bij het ontstaan van ernstige longinfecties door stafylococen kan een voorafgaande virusinfectie een rol spelen, niet alleen door verstoring van het luchtwegenepitheel, maar ook door suppressie van het immunologische apparaat. Dit kan consequenties hebben voor beloop en behandeling van de stafylococen infectie.
6. De sterfte aan longkanker bedraagt volgens het CBS circa 7000 patiënten per jaar. Als gevolg van problemen bij diagnostiek en registratie van deze vorm van kanker bedraagt de onderrapportage naar alle waarschijnlijkheid minstens 10%. De prognose kan aanzienlijk verbeteren bij vroege vaststelling en behandeling van longkanker. Derhalve is het ongerijmd dat de rijkssubsidie op een bestaand systeem van bevolkingsonderzoek met reeds aangetoond rendement, werd ingetrokken.
7. De pathologie geassocieerd met het roken van sigaretten omvat zeer ernstige ziektebeelden. De incidentie kan op eenvoudige wijze belangrijk worden verminderd. Aan deze uitgangspunten dienen vooral de werkers in de preventieve en curatieve zorg die zich bezighouden met mensen in de puberteit en adolescentie, grote aandacht te besteden.
8. Ter bestrijding van enterobius infecties is een goede voorlichting omtrent de wijze van besmetting en het voorkomen van besmetting door hygiënische maatregelen van groter belang dan het verstrekken van antihelminthica.

9. De observatie dat de prevalentie van juveniele diabetes bij HLA DR3/DR4 heterozygotie de risico's verbonden aan DR3 of DR4 duidelijk overtreft, suggereert dat deze determinanten een kwalitatief verschillende rol spelen bij de expressie van de ziekte. (Cahill G F, Mc Devitt H O N Engl J Med 1981; 304: 1454-1465).
10. Steeds meer blijkt dat de samenleving tussen mens en virus aanleiding kan geven tot grote schade voor de mens. Inzicht in en maatregelen tegen de "bemoezucht" van virus zijn dringend nodig.
11. De titel en de auteurs dienen vermeld te worden op de rug van een boek, ook indien het relatief dun is.
12. Ook bij het post-academiaal onderwijs ontstaat pas voldoende kans op effectiviteit indien de genietters actief deelnemen aan het onderwijs. Toetsing is hierbij een essentieel onderdeel.
13. Het gebruik van sterk absorberende wegwerpluiers kan de zindelijkheids-training in ongunstige zin beïnvloeden.
14. De "wereld" kan aan doemdenken "ten onder gaan".

30 september 1981

H. J. Neijens  
Gruttosingel 6  
2903 EC Capelle a/d IJssel