

Stellingen

- 1 GATA-1 overexpressie in erythroid cellen blokkeert het differentie proces.
(Dit proefschrift)
- 2 GATA-1 is niet essentieel voor Sertoli cel functie.
(Dit proefschrift)
- 3 Een belangrijke functie van de, in myeloïde leukemie cellen and normale splenocyten tot expressie komende, perifere cannabinoïde receptor, CB2, is de stimulatie van migratie.
(Jorda et al (2002) Blood 99:2786-2793)
- 4 Expressie patronen van individuele cellen worden gefixeerd gedurende differentiatie.
(de Krom et al (2002) Molecular Cell 9:1319-1326)
- 5 Directe binding van de erythroid kruppel-like factor, EKLF, aan zowel de locus control region, LCR, als aan de β -globine promotor is noodzakelijk voor een hoog niveau van transcriptie van het volwassen globine gene.
(Gillems et al (1998) Genes&Development 12:2863-2873)
- 6 Het achterwege laten van de stellingen en het dankwoord zouden er toe kunnen leiden dat een proefschrift helemaal niet meer gelezen wordt.
- 7 De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De lucht van de luijer-emmer trouwens ook.
- 8 Het feit dat sommige transcriptie factoren zowel in de testis als in de hersenen tot expressie komen, geeft te denken.
- 9 Voor een banketbakker schijnt de zon in december het felst.
- 10 Vooral het afronden van een promotie is een goeie gelegenheid voor een feest.
- 11 Het leukste en langstlopende experiment tijdens mijn promotie is krijgen van Levi.