

---

## Stellingen

---

Als IL-12 wordt gebruikt in doseringen die de maximaal getolereerde dosis benaderen, neemt de inductie van interferon gamma en andere pro-inflammatoire cytokines na enkele toedieningen af.

IL-12 toediening leidt tot productie van haar antagonist IL-10.

Bij herhaalde toediening van IL-12 daalt het oppervlak onder de lineaire plasma concentratie-tijd curve (AUC).

Wanneer IL-12 subcutaan wordt toegediend, kan dit, afhankelijk van de toegediende dosering, leiden tot activatie van verschillende componenten van de ontstekingscascade.

Het langdurige stimulerend effect dat IL-12 heeft op de fibrinolyse is onafhankelijk van de vorming van trombine.

Het verdient aanbeveling om op de glazen plafonds die loopbanen begrenzen plastic plakvogels aan te brengen.

De werkzaamheid van immunotherapeutische middelen neemt niet altijd toe met het stijgen van de toegediende dosis.

Wanneer in een experiment gekleurd water, in vergelijking met ongekleurd water, een gunstig effect heeft op kanker, is er geen enkele noodzaak om dit te geloven (*naar H.M. Woods, 1930*).

Niet de vakbekwaamheid maar de voorkomendheid van de arts bepaalt veelal de tevredenheid van de patiënt over zijn behandeling.

Zangvogels verfraaien hun lied tijdens hun slaap (*Margoliash, 1998*).

Gezinsleden van patiënten met kanker zullen waarschijnlijk meer baat hebben bij diëten zoals dat van Moerman of Houtsmuller dan de patiënt zelf.