

STELLINGEN

1. Bij verdenking op erfelijke progressieve slechthorendheid en bij het gebruik van ototoxische middelen verdient het aanbeveling de gehoordrempel te bepalen tot 16.000 Hz.
2. De in deze dissertatie bestudeerde familie dient na 20 jaar opnieuw onderzocht te worden.
3. Jongeren uit de bestudeerde familie moeten jaarlijks audiometrisch onderzocht worden, enerzijds om de beginleeftijd van de aandoening vast te stellen, anderzijds om een beeld van de progressie in de beginjaren te verkrijgen.
4. Het verdient aanbeveling de gehoordrempel te bepalen bij ieder kind of iedere adolescent met een onverklaarde persisterende haematurie indien het syndroom van Alport wordt overwogen.
5. Het begrip Costensyndroom zoals dit in het leerboek "Keel-, neus- en oorheelkunde" wordt gebruikt is te beperkt en bovendien onjuist; beter is het te spreken van (pijn)dysfunctiesyndroom. Gerlings, P.C., Hammelburg, Em., 1979: Keel-, neus- en oorheelkunde.
6. Het gebruik van alloplastisch materiaal bij gehoorketenreconstructies na otitis media chronica is gedoemd te mislukken.
7. Bij traanvlachten na een fractuur van de bovenkaak dient functieonderzoek van de afvoerende traanwegen te worden verricht.
8. Decubitus is veelal een verpleegfout.
9. Onafhankelijk van het recht op informatie en het recht op inzage kan er volstrekt geen sprake zijn van eigendomsrecht van de patiënt ten aanzien van zijn gegevens in het medisch dossier.
10. De toekomst van de kunst hangt af van hen die bewust kunstgenot zoeken. Janson, H.W., 1981.
11. Wie niet buiten roken kan moet maar buiten roken.

Stellingen behorend bij het proefschrift van W.S.I.M. van den Wijngaart.
Rotterdam, 24 maart 1982

Bachlaan 1
3723 JS Bilthoven

