

STELLINGEN.

1. Prolactine eliminatie vindt in hoofdzaak in de nieren plaats, groeihormoon eliminatie voornamelijk in de lever.
2. De meest kenmerkende verandering in het prolactine-metabolisme bij levercirrhose is de ontremde secretie na TRH stimulatie.
3. De oorzaak van de toegenomen prolactinesecretie bij levercirrhose zonder en met hepatische encephalopathie is verschillend.
4. De behandeling met corticosteroiden van een ulceratieve colitis, welke is ontstaan tijdens of in aansluiting aan een verblijf in de tropen of subtropen, is levensgevaarlijk indien niet het bestaan van een amoebiasis tevoren wordt uitgesloten.
5. Een amoebenabces van de lever dient met 2 weefsel-amoebicide en met 2 contactamoebicide geneesmiddelen behandeld te worden.
6. De behandeling van een recidief oesophagusvaricesbloeding bij een alcoholicus die na de eerste bloeding alcohol blijft drinken is zinloos.
7. Behandeling van ascites bij levercirrhose met de peritoneo-veneuze shunt volgens Leveen is dan pas geïndiceerd als de kans op complicaties na inbrengen sterk is toegenomen.
8. Te vaak wordt vergeten dat het stellen van een diagnose een hulpmiddel is en niet een doel op zich.

9. Een patiënt met een ernstige complicatie bij een ziekte met een op korte termijn infauste prognose hoort niet op een intensive care unit thuis.
10. Onder grotere openheid ten opzichte van de patiënt moet niet worden verstaan het hardop denken aan het ziekbed.
11. Voor het verhogen van het niveau der nederlandse internist zijn verplichte nascholingscursussen van meer belang dan een specialistenexamen.
12. De patiënt compliance met geneesmiddelenregimes is omgekeerd evenredig aan het aantal malen dat een geneesmiddel per dag moet worden ingenomen.
13. Teneinde ernstige ongelukken te voorkomen moet in het hockeyspel de strafcorner ten spoedigste vervangen worden door een penalty slag op het goal, te nemen van de rand van de cirkel.
14. Een voorkeur voor windenergie is een Nederlandse verfijning van het marxisme.