

## STELLINGEN

1. De diepe fascia is niet alleen in de benen en armen maar ook in de romp en het hoofd te vinden. (dit proefschrift)
2. Bloedvaten die een relatie hebben met de diepe fascia spelen ook een rol bij de bloedvoorziening van de huid in bepaalde gebieden. (dit proefschrift)
3. Er zijn drie belangrijke vaatsystemen die verantwoordelijk zijn voor de bloedtoevoer naar de huid: het cutane, het musculocutane en het fasciocutane systeem. (dit proefschrift)
4. Een fasciocutane lap is een gesteelde lap die uit huid, subcutis en diepe fascia bestaat. (dit proefschrift)
5. De chirurgische behandeling van chronische osteomyelitis zou moeten bestaan uit een uitgebreid debridement, waarna een goed gevasculariseerde spier over het benige defect wordt aangebracht.
6. Bij een lang bestaande fascialisparalyse dient temporalis transpositie de voorkeur te hebben boven een gereïnnerveerd, gerevasculariseerd spiertransplantaat.
7. Het corrigeren van een opvallende neusdeformiteit bij een enkelzijdige lipspleet dient tijdens de primaire lipsluiting, of in de vroege jeugd te worden uitgevoerd.
8. Reconstructieve chirurgie kan het beste worden toevertrouwd aan de chirurg die ook in staat is na de operatie de eventuele complicaties te behandelen.
9. Classificatie is een voorwaarde voor methodisch denken en handelen.
10. Afwijkingen van het gelaat zijn meestal gemakkelijk met de vinger, maar moeilijk met het mes te corrigeren.
11. Herstel van de rechtsorde onder andere door middel van strengere straffen is in Nederland dringend nodig.

Rotterdam, 22 april 1988

D.E. Tolhurst

