

STELLINGEN

1. Bij evaluatie van hyposensibilisatie dient de late atopische reactie mede in de beoordeling betrokken te worden.
2. Hyposensibilisatie bij atopisch astma is zeker niet bij voorbaat zinloos.
3. In de literatuur wordt bij de beoordeling van het klinisch effect van hyposensibilisatie met huisstofmijtenextract te weinig rekening gehouden met de dagelijkse expositie aan allergenen van de patienten en met de wijze van uitvoering van de behandeling.
4. De aanwezigheid van specifieke IgE-antistoffen voor inhalatie-allergenen bij patienten met rhinitis en astma is -zonder meer- geen indicatie tot hyposensibilisatie met extracten van de betreffende allergenen.
5. De bevinding, dat degranulatie van mestcellen en basofiele leucocyten volgens een "alles of niets" principe verloopt, heeft belangrijke konsekwenties voor de interpretatie van de farmacologische beïnvloeding van dit proces.
6. Ten onrechte worden meestal bij de bouw en het funktioneren van laboratoria, waar met proefdieren wordt gewerkt, maatregelen achterwege gelaten ter voorkoming van atopie voor dierlijke huidschilfers bij de medewerkers.
7. Indien ferritine een z.g. tumor-marker zou zijn, dan is een hoog gehalte aan ferritine in het serum geen maat hiervoor.

8. Gezien de recente gegevens over de samenstelling van serum-ferritine is het gebruik van de verhouding tussen zure en basische isoferritinen in het serum als diagnostisch criterium bij maligniteiten onjuist.
9. Bepaling van tau-transferrine in liquor cerebrospinalis heeft geen diagnostische betekenis.
10. Het klassieke varkensinfluenzavirus is in staat als epidemisch virus bij de mens te circuleren.
11. Sinds 1978 is in de menselijke populatie een genetische recombinatie van de twee nu circulerende influenza A virussen mogelijk.
12. Ter reconstructie van de spijsweg na laryngofaryngectomie verdient het gebruik van een gerevasculeerd ileum-segment de voorkeur.
13. Het onderzoek naar de positie- en positioneringsnystagmus is van grote betekenis bij de diagnostiek van brughoektumoren.
14. Het vakgebied van de allergologie kan alleen goed uitgeoefend worden bij integrale diagnostiek en behandeling van patienten door de betreffende medicus.
15. De inwendige neusingang wordt te vaak over het hoofd gezien.

18 mei 1983

P.H. Dieges,
Parkhof 3,
2922 CS Krimpen a/d IJssel