

STELLINGEN

1. De premotorische cortex is niet alleen van belang bij de visuele sturing van betrekkelijk onafhankelijke bewegingen van de contralaterale hand en vingers, maar ook bij visueel geleide complexe bewegingsstrategieën van de contralaterale arm en hand.
2. De thalamische afferenten naar het handgebied van de motorische cortex zijn niet essentieel voor de visuele sturing van onafhankelijke hand- en vingerbewegingen.
3. De rol van de colliculus superior bij de visuele sturing van betrekkelijk onafhankelijke hand- en vingerbewegingen is een ondergeschikte.
4. Het concept van twee visuele systemen met essentiële verschillen in functie is onjuist.
5. De grijpreflex vindt waarschijnlijk zijn uitdrukking via de rubrospinale verbindingen.
6. Het begrip “de dominante hemisfeer” wordt nog te vaak gehanteerd, en leidt tot verwarring.
7. Bij de instrumentele expressie van muziek speelt de premotorische cortex van de hersenhelft, die niet dominant is voor taal, mogelijk een belangrijke rol.
8. Het gegeven dat de hersenhelften in sommige functies verschillen en het daardoor ontstane idee van twee verschillende bewustzijnsinhouden binnen één menselijk individu, werpt geen nieuw licht op het begrip bewustzijn.
9. Bij de classificatie van multiple sclerose dienen tenminste ook de gegevens van de door sensorische prikkels opgewekte corticale responsies betrokken te worden.
10. Benzodiazepines dienen aan patiënten met het syndroom van Parkinson met grote terughoudendheid te worden voorgeschreven.

11. De opvatting dat het lage glucosegehalte in de liquor cerebrospinalis bij een bacteriële meningitis berust op glucoseverbruik door de betreffende bacterie is nog te algemeen verspreid.
12. Dat er bij patiënten met het syndroom van Parkinson vaak een symptomencomplex wordt waargenomen dat omschreven zou kunnen worden met de term axiale apraxie geeft steun aan de opvatting dat ook bij de mens de organisatie van axiale bewegingen verschilt van die van extremitetsbewegingen.
13. Het toedienen van beta-adrenerge receptor blokkerende stoffen na een subarachnoïdale bloeding dient telkens serieus te worden overwogen.
14. Bij patiënten met een ischaemie in het stroomgebied van de A. carotis interna zijn operabele afwijkingen met voldoende zekerheid uitgesloten indien de beelden verkregen door intraveneuze digitale subtractie angiografie normaal zijn, zodat in zulke gevallen een intra-arterieel angiografisch onderzoek achterwege kan blijven.
15. Bij elke patiënt met een hyperprolactinaemie dient de schildklierfunctie onderzocht te worden.
16. Zogenaamde protocollaire geneeskunde leidt niet automatisch tot een verhoging van de kwaliteit noch tot een verlaging van de kosten van de gezondheidszorg.
17. De gewoonte om tijdens het zogenaamde discodansen het hoofd bruusk op en neer te bewegen is niet alleen merkwaardig maar ook gevaarlijk.

Rotterdam, 11 januari 1984

L. Moll