

## STELLINGEN / PROPOSITIONS

### I.

Total parenteral nutrition given via the portal vein offers no apparent benefit over parenteral nutrition given via the central-venous pathway.

### II.

The inhibition of intestinal adaptation after intestinal resection in young rats by total parenteral nutrition is largely reversible.

### III.

Tumor growth and nutritional status in hepatoma-bearing rats appear unaffected by total parenteral nutrition with and without Intralipid<sup>®</sup>.

### IV.

Hypothermia induced by prolonged surgery, can decrease the serum potassium level below the normal range, and induce cardiac and respiratory failure.

### V.

Indien bij patiënten lijdend aan colitis ulcerosa of polyposis coli een proctocolectomie moet worden verricht, dient de mogelijkheid van een ileo-anale anastomose te worden overwogen.

### VI.

CT-onderzoek van de thorax en ultrasound-onderzoek van de buik bij patiënten met een oesophaguscarcinoom zijn géén aanwinst voor het praeparatief beoordelen van de resectabiliteit en curabiliteit van de afwijking.

### VII.

Why have we, in Western medicine, gone to such extraordinary measures to remove the parent from involvement in the care of the little patient? The extent to which parents can take excellent care of their children is impressive and should therefore be mandatory.

(Ver. Kind en Ziekenhuis)