

Voor een patient met levercirrhose is 40 gram eiwit per dag te weinig om in stikstofevenwicht te blijven.

De patient met levercirrhose is vaker nuchter dan men denkt.

Een patient met levercirrhose dient vaker dan 3 maal per dag te eten.

Het nut van toediening van vertakte-keten aminozuren voor de behandeling van portosystemische encephalopathie is niet bewezen.

Het is in principe onjuist uit enkelvoudige plasmaconcentratiemetingen uitspraken over het functioneren van weefsels of organen te doen.

De huidige medicamenteuze behandeling van obesitas voldoet niet.

Het gebruik van parenterale voeding als behandeling van het hepatorenaal syndroom verdient nader onderzocht te worden.

Patienten die door hun ziekte af en toe verminderd toerekeningsvatbaar zijn kunnen daardoor in juridische moeilijkheden geraken waarvoor geen afgewogen oplossing bestaat.

Bij mixed connective tissue disease zijn de longen veel vaker - en in ernstiger mate - aangedaan dan aanvankelijk klinisch wordt vermoed.

Gedwongen bezuiniging in de gezondheidszorg, bij voorbeeld op de diagnostiek, vereist dat het de bevolking duidelijk wordt gemaakt dat hiermee toename van onzekerheid ontstaat.

Voor de dagelijkse behandeling van ernstig zieke patienten is bij de arts meer inzicht in de voedingsleer nodig dan thans veelal aanwezig is; teneinde dit inzicht te vergroten dient de voedingsleer in balans te worden gebracht door de klinische tak daarvan te versterken.

Zonder pressiegroep achter zich vaart ook de zeiler niet wel.