

## STELLINGEN

Een progressieve verwijding van de laterale hersenventrikels in het tweede trimester van de zwangerschap, bij een normale distantia biparietalis en schedelomtrek, heeft een zeer slechte prognose.

Omdat foetale hydrocephalie in hoge frequentie gepaard gaat met andere afwijkingen, dient gericht naar deze laatste te worden gezocht, mede i.v.m. de prognose.

De breedte van de voorhoorns van de laterale ventrikels dienen te worden gemeten in het vlak door de distantia biparietalis en distantia fronto-occipitalis.

Bij x-gebonden hydrocephalie is stenose van de aquaductus Sylvii niet de primaire laesie.

De echoscopisch waarneembare "doos"-vormige structuur in de midline op éénderde afstand van het synciput is waarschijnlijk een deel van het corpus callosum en niet het cavum septi pellucidi.

In geval van serotiniteit bij een multigravida met een onrijpe portio en een kind in afgeweken lengteligging, dient de diagnose voldragen tubaire graviditeit te worden overwogen.

De behandeling van de gedisloceerde supracondylaire humerus fractuur bij kinderen dient te bestaan uit repositie onder doorlichting in algehele anaesthesie, gevolgd door fixatie met percutaan geboorde K-draden.

Er moeten richtlijnen van overheidswege komen voor kwaliteitscontrole van diagnostische ultrageluidsapparatuur om duurzame veiligheid en optimale werkzaamheid van ultrageluidstransducers te verzekeren.

Bij afwezigheid van klachten behoeft een IUD niet te worden verwijderd indien in de cervixcytologie Actinomyces Israëlii wordt gevonden.

Van de plannen ter bestrijding van de werkeloosheid van jonge specialisten, bestaande uit beperking van de opleidingscapaciteit en uitbreiding van de specialistische maatschappen, is met voortvarendheid slechts het eerste gedeelte uitgevoerd.

De frequent op achterruiten van auto's te lezen uitspraak: "..... do it .....", pleit niet voor de inventiviteit van de betreffende sportbeoefenaar.

Rotterdam, 23 oktober 1985

A. van Egmond-Linden