

Stellingen

1. Het toedienen van antacida of histamine-2-antagonisten ter voorkoming van stress ulcus, anders dan Cushing's ulcer of Curling's ulcer, heeft geen goede wetenschappelijke basis.
2. Hoewel prostaglandines op grond van verrichte onderzoeken zinvol lijken voor stress ulcus prophylaxe, is het praktische nut in dit opzicht niet bewezen.
3. Preventie van stress ulcus bestaat voornamelijk in het snel en adequaat behandelen van risicofactoren en het geven van optimale voeding.
4. Peroxidase tests zijn niet geschikt voor bepaling van bloed in maagsap; conversie van heem naar fluorescerend porphyrine is betrouwbaar en bovendien kwantitatief, en deze methode verdient daarom de voorkeur.
5. Galsteenpancreatitis en acute cholangitis zijn goede indicaties voor ERCP (endoscopische retrograde cholangiopancreatografie) met papillotomie.
6. Colonlavage, mits goed uitgevoerd, is een niet-belastende procedure.
7. Angiomatosis van de maag wordt vaak òf niet herkend òf als nieuwe entiteit gepubliceerd.
8. In elke patiëntenstatus hoort een samenvatting en/of conclusie.

9. Ingrijpen in het inkomen van de gevestigde specialist leidt tot inperking van de instroom van de werkzoekende specialist.
10. Schoonmoeders kunnen ook makkelijk zijn.
11. De Heidelbergse catechismus geeft antwoord op veel vragen.

Rotterdam, 16 april 1986

H.A. van Essen.