

Stellingen

I

Na totale heupvervangning is poliklinische behandeling met orale anti-coagulantia gedurende drie maanden aan te bevelen. Hierbij moet naar een gemiddelde Thrombotest van 15% (INR 2,1) gestreefd worden.

II

Bij een klinische longembolie na een gewrichtsvervangende operatie is intraveneuze toediening van heparine niet zonder meer geïndiceerd.

III

De dynamische heupschroef is ongeschikt voor de osteosynthese van mediale collumfracturen.

IV

De voorste kruisband is onvervangbaar.

V

Arthrose kan het gevolg zijn van pathologische veranderingen in de synoviale membraan.

VI

Bij de operatieve behandeling van de reumatische voorvoetdestructie verdient een metatarsofalangeale arthrodese van de eerste straal de voorkeur boven een resectiearthroplastiek.

VII

De introductie in Nederland van gewrichtsendoprothesen wordt onvoldoende wetenschappelijk begeleid. Voor deze introductie dienen wettelijke normen gesteld te worden.

VIII

Een dysplasie van het acetabulum heeft een vermindering van het dragend oppervlak tot gevolg. Een variserende osteotomie vergroot dit oppervlak niet, en een pandakverbeterende ingreep verdient daarom de voorkeur.

IX

Voor een adequate behandeling van beenlengteverschillen bij kinderen zijn een jaarlijkse orthoröntgenologische meting van de beenlengte en een regelmatige bepaling van de skeletleeftijd voor de grafiek van Moseley onontbeerlijk. Bij voorkeur worden deze kinderen vervolgd op een daartoe ingesteld beenlengtespreekuur.

X

Het verbieden van de omgekeerde kleermakerszit (television-watch-position) bij coxa anteverta is zinloos.

XI

In de ruitersport wordt kwaliteit gekenmerkt door eenvoud, rust en wederzijds vertrouwen.

XII

Vooraf het stellen van een limiet aan de ATV blijkt Arbeids-Tijd Verslindend.

XIII

De uitdrukking "om heel eerlijk te zijn" vormt vaak de inleiding tot een onaangename mededeling. Dit leidt wellicht op den duur tot een onbedoelde wijziging van de gevoelswaarde van het begrip "eerlijkheid".

Stellingen behorende bij het proefschrift

"Tromboembolische complicaties na totale heuparthroplastiek"