

STELLINGEN

1. Een opgelegd vertraagd expirium tijdens kunstmatige beademing bevordert de gaswisseling in de longen. Deze vorm van beademing verdient vooral aanbeveling bij patienten met een ernstige luchtwegobstructie.
2. Tijdens een éénmalig maximaal verlengd expirium binnen de beademingscyclus wordt meer koolzuur uitgedemd en benadert de eind-expiratoire koolzuurspanning de waarde die gevonden wordt voor de arteriële koolzuurspanning. Het toenemen van de koolzuurspanning in de expiratielucht berust op een voortgaande CO₂ overdracht gedurende het verlengde expirium.
3. De thermodilutie methode voor bepaling van de cardiac output tijdens kunstmatige beademing is voldoende betrouwbaar, voor klinische toepassing, indien drie tot vier bepalingen, die gelijkmatig verdeeld zijn over de beademingscyclus, gemiddeld worden.
4. Bij patienten met een chronisch aspecifieke longaandoening verdient de dwarse laparotomie de voorkeur boven de mediane laparotomie.
5. Bij een patient met een onbegrepen intermitterende haematemesis en/of melaena gepaard gaande met krampende pijn in de linker bovenbuik moet gedacht worden aan een wirsungorrhagie.
6. Voor de operatieve therapie van een invaliderende en niet op conservatieve middelen reagerende gastro-oesofageale reflux lijkt het gezegde: "Eenvoud siert de behandeling" van kracht, en kan de ligamentum teres cardiopectie de operatie der keuze worden.
7. Als een patient, lijdende aan de ziekte van Recklinghausen, bloedt uit de tractus digestivus of intra- c.q. retro-peritoneaal, dient een neurofibroom als oorzaak van de bloeding hoog in de differentiaal diagnose te staan.
8. Voor de behandeling van het Zenkers divertikel verdient chirurgische therapie de voorkeur, via een benadering achter de musculus sternocleidomastoideus langs.
9. Door het cytologisch onderzoek van mammatumoren worden het peroperatieve onderzoek door middel van vriescoupe en de "verrassing" voor de patient vrijwel overbodig, terwijl het risico als verwaarloosbaar mag worden beschouwd.
10. Pre-operatieve radiotherapie bij het rectum carcinoom is mogelijk zinvol, echter zeker niet obligaat geïndiceerd.
11. Het solitaire ulcus van het rectum ontstaat door een traumatische beschadiging van het slijmvlies tijdens het persen.

12. Het nationaliseren van de gezondheidszorg is strijdig met het deregulerings en privatiseringsbeleid van de overheid.
13. Het is te betreuren, dat de aantrekkingskracht van een politieke partij zo vaak bepaald wordt door één persoonlijkheid hetgeen de schijn van volksmennerij heeft.
14. De eis dat de opleider gepromoveerd moet zijn is geen waarborg voor de kwaliteit van de opleiding tot specialist.
15. Indien iemand, die (professioneel) sport bedrijft op de daartoe geëigende momenten zonder tekenen van agressiviteit zijn meerdere erkent in de tegenstander, zal dit een gunstige invloed hebben op de actieve en passieve sportbeleving.
16. De huidige procedure van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ten aanzien van aanname van assistent geneeskundigen in opleiding geeft aanleiding tot veel gemor en gekmor.
17. In Leiden is op werelddierendag de meeste aandacht gericht op de kater.

W. van Rooyen

Rotterdam, 6 juni 1986