

STELLINGEN

1. Bij patienten met acute leverinsufficiëntie of terminale chronische leverinsufficiëntie moet de toepassing van auxiliaire partiële levertransplantatie worden overwogen.
2. Transplantatie tussen DLA-identieke donor-ontvanger combinaties vermindert bij de Beagle de kans op acute afstoting van een auxiliair partieel levertransplantaat.
3. Enkele aangeboren stofwisselingsziekten vormen een mogelijke indicatie voor auxiliaire partiële levertransplantatie; nadere bestudering van de functionele competitie tussen het transplantaat en de lever van de ontvanger is hiervoor echter een vereiste.
4. Problemen met de galweg anastomose na levertransplantatie zijn het gevolg van inadequate bloedvoorziening van de ductus choledochus van het transplantaat.
5. Bij uitgebreide leverresecties dient tijdens de operatie echografie verricht te worden.
6. Het nuttig effect van drainage van het galblaasbed na ongecompliceerde cholecystectomie staat niet vast.
7. Solitaire intrahepatische abcessen moeten, indien technisch mogelijk, bij voorkeur primair behandeld worden middels echografisch geleide punctie en drainage.
8. Anus dilatatie als behandeling van de chronische anus fissuur moet als obsoleet worden beschouwd, gelet op de resultaten van de poliklinisch uitgevoerde laterale interne sfincterotomie.
9. Bij verdenking op multipole darmstenosen dient peroperatief de doorgankelijkheid van de darm getest te worden middels een in het lumen gebrachte knikker.

10. Ieder bloedverlies in de tractus digestivus na implantatie van een aortabifurcatie prothese moet beschouwd worden als symptoom van een secundaire aortoenterale fistel, tot het tegendeel bewezen is.
11. De selectie procedure die thans gevolgd wordt bij de toelating tot de opleiding algemene heelkunde is vermoedelijk niet de beste.
12. Verzoek van een patient tot inzage van zijn status duidt op een gestoorde arts-patient relatie.
13. Een breukgleuf in tabletten wekt ten onrechte de verwachting dat een accurate halve dosering is te bereiken door de tablet door midden te breken.
14. Een chirurg die 's nachts geruime tijd gewerkt heeft moet de daarop volgende ochtend niet opereren.
15. Wanneer men zich in een zeilvaartuig op open zee begeeft, dient dat vaartuig tenminste voorzien te zijn van een zelflozende kuip.

C.B. Reuvers

Rotterdam, 27 juni, 1986.