

## STELLINGEN

1. Er zijn aanwijzingen dat het ziektebeloop bij acute hepatitis B reeds is vastgelegd voordat de ziekteverschijnselen optreden.  
*dit proefschrift*
2. Herhaalde kwantitatieve bepaling van HBsAg of HBeAg tijdens acute hepatitis B kan van nut zijn bij de vroege identificatie van patienten met een chronisch ziektebeloop.  
*dit proefschrift*
3. Het gelijktijdig voorkomen van HBsAg en atypisch anti-HBs bij patienten met chronische hepatitis B is geen zeldzaamheid.  
*dit proefschrift*
4. De afwijkende verdeling van fenotype-frekwenties van HLA bij patienten met chronisch actieve hepatitis B steunt de opvatting dat genetische factoren van invloed zijn op de ernst van levercelbeschadiging.  
*dit proefschrift*
5. Toediening van Chenodeoxycholzuur aan patienten met Erythrohepatische protoporfyrie remt waarschijnlijk de protoporfyrieproduktie.  
*J. Hepatol 1986; in press*
6. De ernst van cholestatische hepatitis bij Erythrohepatische protoporfyrie kan worden verminderd met behulp van bloedtransfusies.  
*submitted for publication*
7. Behandeling van de ziekte van Wilson met Zink-sulfaat is veilig en effectief.  
*J. Neurol Sci 1986; in press*
8. Voor de bestudering van het effect van farmaca op de motoriek van de onderste slokdarmsfincter is langdurige registratie in zowel de interdigestieve als de postprandiale toestand vereist.  
*Gastroenterology 1985; 88: 557-563*
9. Het aantonen van homogene IgA-deposities langs de sinusoiden van de lever is een gevoelige en specifieke methode om alcohol als oorzaak van leverbeschadiging aan te wijzen.  
*submitted for publication*
10. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is besmettelijk; door het huidige overheidsbeleid wordt deze besmettelijkheid bestreden.

Stellingen behorend bij het proefschrift "Hepatitis B virus infection: factors influencing the outcome".