

STELLINGEN

- I Patiënten met een gecompenseerde HBsAg-positieve levercirrhose hebben een goede levensverwachting.
- II Ter voorkoming van dosisbeperkende bijwerkingen dient α -interferon niet gecombineerd te worden met zidovudine.
- III Suïcide is een bijwerking van α -interferon therapie.
- IV De klinische relevantie van HBV-DNA bepaling met de polymerase kettingreactie wordt sterk overschat.
- V Verlies van actieve deling van het hepatitis B virus (HBsAg seroconversie) verbetert de levensverwachting van patiënten met een HBsAg-positieve levercirrhose aanzienlijk.
- VI Standaardisatie van de HBV-DNA bepaling zou een belangrijke stap voorwaarts zijn bij onderzoek naar de behandeling van chronische hepatitis B.
- VII Percutane en laparoscopische leverbiopsieën kunnen op een veilige manier poliklinisch verricht worden.
- VIII Anno 1993 mag geen enkele patiënt overlijden aan een leverziekte zonder dat levertransplantatie overwogen is.
- IX Het volkomen serieus rapporteren over de relatie tussen bijvoorbeeld elektrische dekens en spina bifida in het nageslacht, is het gevolg van de hoge prevalentie van epidemiologen in combinatie met de lage incidentie van m.b.v. epidemiologisch onderzoek oplosbare problemen (P. Skrabanek).
- X Zowel mens als natuur zouden opgelucht ademhalen indien het aantal verkeerslichten in Nederland gereduceerd zou worden.
- XI Een promovendus moet leren leven met de stelling dat de meeste lezers van het proefschrift zich beperken tot de stellingen.
- XII V.N. vreedestaken waarvoor een toenemende bewapening nodig is bestaan niet.
- XIII Het onderwijs in Nederland zou sterk verbeteren indien de opeenvolgende ministers het niet steeds trachten te verbeteren.
- XIV In de geneeskunde dreigt het gevaar dat een wetenschappelijke promotie gedegradeerd wordt tot een sollicitatie-eis voor de opleiding tot medisch specialist.