

## Stellingen

1. De belangrijkste oorzaak van toegenomen fibrinolyse tijdens orthotopie levertransplantaties is gebrek aan klaring van tissue-type plasminogen activator tijdens de anhepatische fase.
2. Intravasale stolling speelt een ondergeschikte rol bij de bloedingsproblemen tijdens levertransplantaties.
3. Heparine toegediend aan de ene patient, kan bloedingscomplicaties in een andere patient veroorzaken (hoofdstuk 6).
4. De restfunctie van de eigen lever is van belang bij het voorkomen van bloedingscomplicaties tijdens auxiliaire levertransplantaties.
5. Thuisbehandeling van patienten met diep veneuze thrombose met subcutaan toegediende laag moleculaire heparines is praktisch toepasbaar (*Bakker et al. Lancet 1988;ii:1142*) en kan een tal van ziekenhuisopnames overbodig maken, zonder het risico op longembolieën te vergroten (*Prandoni et al., Lancet 1992;339:441*).
6. Dat een operatie technisch mogelijk is, is niet het beste argument voor de uitvoering ervan.
7. Het cellen tekort in Nederland zou niet meer bestaan, als gevangenen dezelfde behandeling zouden krijgen als bejaarden; zes individuen op één zaal.
8. Als er nu niet voldoende middelen voor adequate thuiszorg worden vrijgemaakt, dan hebben we binnenkort alleen nog inadequate intramurale zorg.
9. Een optimist gelooft dat we in de beste van alle werelden leven. Een pessimist vreest dat dit waar is.
10. Een conclusie is de plaats waarop je het denken moe geworden bent.
11. The fish will be the last to discover water (*J.C. Brunner*).

Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld: "Hemostasis and the diseased liver"