

## Stellingen

behorend bij het proefschrift van Peter D. Siersema

1. Zonder ijzer geen uroporfyrie.

*Dit proefschrift*

2. Uroporfyrie wordt, behalve door een verminderde activiteit van het enzym uroporfyrinogeen decarboxylase, ook gekenmerkt door een toegenomen activiteit van het enzym porfobilinogeen deaminase.

*Dit proefschrift*

3. Het therapeutisch effect van desferrioxamine bij uroporfyrie berust op de chelatie van de fraktie ijzer, die beschikbaar is voor de produktie van vrije zuurstof radicalen.

*Dit proefschrift*

4. Patienten met porfyria cutanea tarda dienen behandeld te worden voordat cirrhose van de lever is opgetreden.

*Dit proefschrift*

5. De kweekresultaten bij verdenking op spontane bacteriële peritonitis kunnen verbeterd worden als ascites direkt aan bed in bloedkweekflesjes wordt gebracht.

*J Clin Microbiol 1992; 30: 667-669*

6. Drainage door middel van een endoscopisch geplaatste gastrostomie-catheter, bij patienten met intestinale obstructie op basis van een intraperitoneaal gemetastaseerde maligniteit, verdient de voorkeur boven een chirurgische ingreep.

*Surg Gynecol Obstet 1993; 176: 469-474*

7. Het is (nog) niet bewezen dat cholesterol-verlagende maatregelen de mortaliteit verminderen en de prevalentie van hart- en vaatziekten doen afnemen.

*Brit Med J 1992; 305: 15-19*

8. "Starre" oesofoscopie is een obsoleete ingreep.

9. Een gastro-enteroloog dient tevens opgeleid te zijn tot internist.

10. Het advies dat het voor een overheid "... verstandiger is de reputatie van gierigheid te behouden - want deze heeft een slechte naam zonder haat als gevolg - dan vrijgevig genoemd te worden en daardoor zware belasting te moeten opleggen - want deze heeft een slechte naam met haat als gevolg...", is 480 jaar na dato nog steeds van toepassing.

*Machiavelli, Il Principe*

11. Individueel gezondheidsgedrag bemoeilijkt een gemeenschappelijke discussie over keuzen in de gezondheidszorg.