

STELLINGEN

1. Elastic recoil geeft een halvering van de winst in minimale luminale diameter direct na een geslaagde coronaire ballondilatatie procedure maar is niet van invloed op (late) restenose.
2. Patiënten met onstabiele angina pectoris hebben meer kans op ernstige cardiale complicaties tijdens of vlak na een ballondilatatie procedure.
3. Angiografisch zichtbare dissecties hebben geen invloed op het restenose proces en op de cardiale status 6 maanden na een geslaagde coronaire ballondilatatie procedure.
4. Het restenose proces breidt zich uit in de vaatwand direct naast de gedilateerde coronaire vernauwing.
5. Na een geslaagde coronaire ballondilatatie krijgt iedere patiënt te maken met enige mate van restenose.
6. Het proximale segment van de ramus descendens anterior heeft dezelfde kans op restenose als enig ander coronair segment.
7. De interventietechniek met een gouden toekomst voor de preventie van restenose zal een grote "relatieve winst" laten zien met een minimum aan "relatief verlies".

8. Het voorspellen van welke patiënten restenose zullen krijgen lijkt op het voorspellen van de uitslag van politieke verkiezingen en van de kwartaalwinsten van multinationals.

9. Voor het afleveren van gekochte artikelen, moet je tenminste twee keer thuis zijn: de eerste keer als ze thuis bezorgd en gemonteerd worden, de tweede keer als (de noodzakelijke) reparaties uitgevoerd moeten worden.

10. Iedereen die nu nog begint met roken zou al zijn niet rokende medemensen een uitkering moeten betalen. Dit in navolging van rokers in de Verenigde Staten die geleden schade verhalen op de tabaksfabrikant.

11. EHBO betekent voor sommige mensen "Eerste Hulp Bij Ongemakken".

12. Een toename van de behoefte aan speciaal onderwijs in Nederland kan voorkomen worden door de kinderopvang te verbeteren.

13. Het aantal vlinders in een tuin neemt af bij aanwezigheid van een kat.

14. Het lopen van een marathon is meer een psychische dan een lichamelijke overwinning.

Stellingen bij het proefschrift "ELASTIC RECOIL, DISSECTION and RESTENOSIS in patients treated by coronary balloon angioplasty" van W.R.M. Hermans, Rotterdam, 25 november 1992.