

STELLINGEN

I

Bij een kind dient er rekening mee gehouden te worden dat een trauma van de subglottis kan leiden tot een abnormale uitgroei van het cricoid, resulterend in een vernauwing van de luchtweg.

II

Het gunstige effect van een "anterior cricoid split" bij kinderen met een "décanulement difficile" is te danken aan de "interlocked stress" in het kraakbeen.

III

Een transversale snede door het slijmvlies bij een tracheotomie op de kinderleeftijd is een kunstfout.

IV

Bij aanwezigheid van ectopisch kraakbeen in de subglottische larynx dient aan een post-traumatische afwijking gedacht te worden.

V

Poreus hydroxyapatiet heeft een even goede biocompatibiliteit met been als met kraakbeen.

VI

Bij patiënten met het syndroom van Sjögren dient men bedacht te zijn op het ontstaan van een non-Hodgkin-lymfoom.

VII

Op grond van de ontogenese mag verwacht worden dat het septum petrosquamosum (Körner) vaker bij jongere dan bij oudere individuen voorkomt.

VIII

De 40 Hz Middle Latency Response is een veelbelovende methode voor objectieve meting van de gehoordrempel bij wakkere kinderen.

IX

Het opleiden van organisatieleden is een selectieve investeringsbeslissing en behoort derhalve tot de verantwoordelijkheid van het management.

X

Het gebruik van een "neusdouche" verdient herwaardering.

XI

Loopneus en loopoor gaan vaak hand in hand.

XII

Een norminkomen \neq enorm inkomen.

stellingen behorende bij het proefschrift
SUBGLOTTIC STENOSIS AND CRICOID GROWTH
van F.C.P.M. Adriaansen
Rotterdam, 26 juni 1987