

STELLINGEN

1. Een discontinuïteit in groeiend septaal kraakbeen herstelt zich niet.
2. De mate waarin het perichondrium van het kraakbenige neustussenschot reageert op een trauma hangt af van de onderlaag.
3. Groei van het kraakbenige neustussenschot is "area dependent" en "age dependent".
4. Bij een septumcorrectie is het oplichten van het mucoperichondrium aan twee zijden niet beter dan het eenzijdig tunnelen, gelet op de uiteindelijke vorm van het septum.
5. Ook in deze tijd van toegenomen mogelijkheden ter behandeling van ongewenste infertiliteit blijft het zo dat niet ouders recht hebben op kinderen, maar dat kinderen recht hebben op een goede opvoeding.
6. Er is geen indicatie voor chemotherapie ter behandeling van plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-hals gebied, tenzij in het kader van een trial.
7. Bij uitgebreide tongbasiscarcinomen is de behandeling van de primaire tumor met interstitiële radiotherapie te verkiezen boven andere behandelingsmethoden.
8. Bij behandeling van diep gelegen tumoren in het hoofd-hals gebied verdient interstitiële hyperthermie met 27 MHz antennes de voorkeur boven het gebruik van uitwendige applicatoren.
9. Wanneer in het ventrale deel van de mandibula een defect is ontstaan na een commando-resectie, dient dit bij voorkeur met een "radial forearm flap" (=vrij gevasculariseerd bottransplantaat met huid) gesloten te worden.
10. Het behandelen van een patiënt met acute leukemie buiten een goed geoutilleerd haemato-oncologisch centrum dient als een kunstfout beschouwd te worden.

11. Een kankerziekenhuis leent zich niet voor financiering via een systeem van gefixeerde budgettering.
12. Alleen met een goede neus voor onderzoekslijnen kan men het universitaire hoofd boven water houden.
13. Virusinfecties bij computers nemen door onbeschermd schijf-schijf contact steeds ernstiger vormen aan.

Stellingen behorend bij het proefschrift
"Wondreacties in het kraakbenige neustussenschot"
C.A. Meeuwis
27 april 1988