

STELLINGEN

I

Nasofaryngeale radiumbestraling ter behandeling van ooraandoeningen geeft een licht verhoogd risico op het ontstaan van een stralengeïnduceerde tumor op lange termijn.

Dit proefschrift

II

Nasofaryngeale radiumbestraling ter behandeling van ooraandoeningen dient niet meer, zoals vroeger, op grote schaal te worden toegepast.

Dit proefschrift

III

Bij contraïndicaties voor of falen van gangbare behandelingswijzen van dysfunctie van de buis van Eustachius kan radiotherapie door middel van strontiumapplicatie worden overwogen.

IV

Stralengeïnduceerde tumoren kunnen verschillen van 'spontane' tumoren in manifestatie (1), histologische aard (2) en metastasering (3).

(1) Van Daal, W.A.J. Proefschrift 1981

(2) Littman, M.S. e.a. Am J Röntgenol 131: 773-85, 1978

(3) Martin, H. e.a. Cancer 25: 61-71, 1970

V

Ten behoeve van historisch cohortonderzoek zal vaak een uitzondering moeten worden gemaakt op de regel dat de hulpverlener alleen met toestemming van de patiënt inlichtingen over de patiënt aan derden verstrekt.

Voorontwerp van wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst Art. 1653m

Wet op de persoonsregistraties Art. 11

VI

Indien de stralingsdosis bij ongevallen met kerncentrales zodanig hoog is dat met zekerheid schade aan de gezondheid van een groep mensen is toegebracht, ook al zal die zich eerst op lange termijn manifesteren, dient deze groep schadeloos gesteld te worden. Het moment en de omvang van de schadeloosstelling dienen bepaald te worden door het moment en de hoogte van de expositie van de groep en niet door het, door het ongeval teweeggebrachte, gevolg bij het individu.

VII

Bij het waarschuwen tegen zonnebaden wegens het risico op het ontstaan van huidkanker, dient men te beseffen dat deze aandoening doorgaans goed te behandelen is.

VIII

De prognose van secundaire lues van de nervus facialis is goed, mits tijdig penicilline wordt gegeven.

Verduijn, P.G. e.a. Arch Otolaryngol 108: 382-4, 1982

IX

Wegens het risico op inductie van adenocarcinoom van de neusbijholten door houtstof, dient de blootstelling aan houtstof van werknemers in de meubel- en parketindustrie te worden beperkt tot minder dan 1 mg/m³.

Hayes R.B., e.a. Technisch Rapport Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg EUR 1984
Rapport NIPG-TNO Arbeidsomstandigheden meubelindustrie 1985

X

Bij het aanbevelen van alcoholische dranken ter behandeling van faryngitis chronica (1), na lichamelijke inspanningen (2) en ter voorkoming van een hartinfarct (3), dient het gevaar van de alcoholverslaving in de overwegingen te worden betrokken.

(1) Jongkees, L.B.W. Keel-, neus- en oorheelkunde voor de algemene praktijk 1980

(2) Brok, A.G.M.F. e.a. Nederl Milit Geneesk T 29: 187-230, 1976

(3) Knipschild, P. Hart Bulletin 13: 24-32, 1982

XI

Het zou de gezondheidszorg ten goede komen als een wetswijziging zou worden doorgevoerd zodat slechts zij, die hun lichaam of delen daarvan niet ter beschikking willen stellen voor pathologisch-anatomisch onderzoek of transplantatiechirurgie een codicil van die strekking bij zich hoeven te dragen.

XII

Indien sportlieden aan een aandoening lijden waarvoor zij medicijnen gebruiken die als nevenwerking de prestaties kunnen verhogen, dienen zij zich voor de duur van die mogelijke nevenwerking van wedstrijden te onthouden.

XIII

Vanuit epidemiologisch standpunt is het, in tegenstelling tot de thans waarneembare neiging, gewenst, medische gegevens langdurig te bewaren.

XIV

Angst voor straling is een slechte raadgever.

stellingen behorende bij het proefschrift
**LATE HEALTH EFFECTS OF RADIATION
FOR EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTION**

P.G. Verduijn
Rotterdam, 15 juni 1988