

Stellingen

- 1 Voor nadere diagnostiek van een onbegrepen zwelling in de hals is echografie het onderzoek van eerste keus.
- 2 Echografie van een zwelling in de hals beperkt het aantal indicaties voor cytologisch onderzoek.
- 3 De echo-geleide cytologische punctie verdient de voorkeur boven de palpatie-geleide cytologische punctie.
- 4 Schildklierscintigrafie, voorafgaand aan een operatie wegens een anomalie van de ductus thyreoglossus, wordt overbodig, indien orthotoop schildklierweefsel echografisch is aangetoond.
- 5 Het is niet mogelijk om door middel van echografie benigne en maligne speekselkliertumoren te onderscheiden.
- 6 Wanneer een veilige punctieroute kan worden vastgesteld is percutane abcesdrainage te verkiezen boven chirurgische drainage. (J.S. Laméris, proefschrift oktober 1987)
- 7 Vanwege zijn inzicht in en ervaring met beeldvormende diagnostiek is de radio-diagnost de geëigende persoon om echografisch onderzoek te verrichten.
- 8 Het is aan te bevelen om, voorafgaand aan een intraveneuze toediening van een jodiumhoudend contrastmiddel een infuus in te brengen, zodat tijdig adequate medicatie toegediend kan worden bij een contrastmiddel reactie.
- 9 Bij verdenking op een darminvaginatie verdient echografie als diagnosticum de voorkeur boven een barium-contrast onderzoek.
- 10 Neuro-radiologische interventies dienen uitsluitend in hiertoe gespecialiseerde centra uitgevoerd te worden.
- 11 De mogelijkheid van MRI om sagittale beelden te vervaardigen is van waarde bij de beoordeling van de foraminae van de lumbale wervelkolom.
- 12 Beter een cytologische punctie te verrichten dan het mes op de keel te zetten.
- 13 Het afbreken van de Berlijnse muur geeft aan hoe betrekkelijk vaststaande feiten zijn.