

STELLINGEN

(Bij het proefschrift van Jan Peter Flipse, 5 december 1990)

1. Optimale visuele perceptie tijdens oscillatoire bewegingen van het hoofd berust op het bestaan van observatie-intervallen.
2. Het vermogen scherp te zien tijdens hoofdbeweging wordt onvoldoende verklaard door de hypothese, dat de tolerantie van het visuele systeem voor enige retinale beeldbeweging de tekortkomingen in de vestibulo-oculaire respons compenseert.
3. De vestibulo-oculaire reflex tijdens hoofdbeweging kan gekwantificeerd worden met behulp van uitsluitend visuele stimuli zonder de oogbewegingen te meten.
4. Neusprovocatieprouwen met histamine, waarbij in plaats van de neuswegweerstand eenvoudig de secreetproductie tesamen met het aantal niezen wordt bepaald, hebben een duidelijke klinische relevantie.
(R. Gerth van Wijk and P.H. Dieges; Clin. Allergy, 1987, 17, 563-570)
5. Bij doofheid aan twee oren ten gevolge van een meningitis dient binnen een half jaar een "cochlear implant" geplaatst te worden, indien spontaan herstel van het gehoor uitblijft.
6. De operatie volgens Denker is als laatste redmiddel voor patienten met hardnekkig recidiverende rhinosinitiden en neus(bijholte)poliepen een effectieve en veilige behandeling.
7. Het angstvallig streven naar normoglycaemie is vooralsnog van weinig invloed gebleken op de progressie van de diabetische retinopathie.
8. Het staken van de sondevoeding aan (diep)comateuse patienten teneinde een natuurlijke dood na te streven, moet binnen de huidige medisch-ethische context als een verwerpelijke vorm van euthanasie worden beschouwd.
9. Het electrocardiogram verdacht voor een onderwand-infarct dient onverwijld aangevuld te worden met een "rechter precordiale uitdraai" teneinde een rechterventrikel-infarct en bijzondere behandeling daarvan uit te sluiten.
10. Het schrijven van dit proefschrift tijdens de zestien maanden militaire dienst, lijkt het nut van deze plicht onomstotelijk te bewijzen.
(Maart 1989, juni 1990)