

1. De wereldwijd meest gebruikte classificatie van congenitale afwijkingen van de bovenste extremiteit is gebrekkig in uniformiteit (dit proefschrift).
2. Adequate beschrijving van congenitale afwijkingen is onontbeerlijk om consistente classificaties mogelijk te maken (dit proefschrift).
3. Het landelijk ingevoerde registratiesysteem voor schisis is voldoende valide om betrouwbaar te gebruiken voor onderzoek (dit proefschrift).
4. Morfologisch ernstigere vormen van schisis worden met een hogere betrouwbaarheid geregistreerd dan morfologisch milde vormen (dit proefschrift).
5. Onze nieuwe schisisclassificatie maakt het mogelijk de diverse schisistypen in te delen op basis van overeenkomstige pathoembryologie (dit proefschrift).
6. Het postoperatieve esthetische resultaat na een primaire bilaterale mamma-reconstructie middels deep inferior epigastric artery perforator lappen is gelijk aan de preoperatieve situatie (Mureau, submitted).
7. Mandibulareconstructie bij osteoradionecrose door middel van vrij gevasculariseerde botlappen hebben meer complicaties dan vrij gevasculariseerde weke delen lappen (Baumann, 2011).
8. Complexe open onderbeen letsels horen primair behandeld te worden in een traumacentrum met uitgebreide expertise op het gebied van plastisch reconstructieve chirurgie (NVPC richtlijn, 2012).
9. Bij complexe letsels van de bovenste extremiteit is het initiële debridement de belangrijkste stap die uiteindelijk de functie zal bepalen. Dit is dan ook geen assistenten ingreep (Vedder, 2005).
10. "There is almost no correlation between the extent of physical damage suffered and the response of that individual to it." (Beasley, 2003).
11. De stormachtige ontwikkelingen om het gehele genoom per patiënt in kaart te brengen zullen het moleculair genetische landschap voorgoed veranderen.