

1

Dubbellabeling van een myeloïde marker en het enzym terminal deoxynucleotidyl transferase is een bruikbare methode voor het opsporen van kleine aantallen abnormale myeloïde cellen in het beenmerg en bloed van MDS patiënten.

Dit proefschrift

2

De groeikinetic van gecommiteerde voorlopercellen uit MDS beenmerg suggereert dat deze cellen zich langer in de G0 fase van de celcyclus bevinden dan hun normale tegenvoeters.

Dit proefschrift

3

Het synergistisch effect van Il-6 en GM-CSF op myeloïde voorlopercellen in MDS-beenmerg kan niet verklaard worden door een 'priming' effect van Il-6.

Dit proefschrift

4

Bij patiënten met een refractaire anemie met ringsideroblasten in het beenmerg dient tevens gezocht te worden naar tekenen van dysgranulopoïes en dysmegakaryopoïes, aangezien deze de prognose ongunstig beïnvloeden.

Gatterman et al. Br J Haematol 1990; 74: 45.

5

Het onvermogen om een beenmergbiopsienaald in te brengen bij een patient met een "hairy cell leukemia" kan wijzen op het bestaan van een geassocieerde osteosclerose.

Eigen ervaring

Van der Molen et al. Blood 1989; 74: 2066

6

Een relapse van Wegener's granulomatosis kan voorkomen worden door reeds behandeling in te stellen bij een stijging van de ANCA-titer.

Cohen Tervaert et al. Lancet 1990; 336: 709.

7

Immunotherapie met het humane antilichaam HA-1A, welke gericht is tegen endotoxine, is effectief bij de behandeling van patiënten met een gram-negatieve bacteriëmie en septische shock.

Ziegler et al. N Engl J Med 1991; 324: 429.

8

De zuurstofspanningssensor, die de productie van erythropoetine reguleert, is een haem-eiwit.

Golberg et al. Science 1988; 242:1412.

9

Het al dan niet anamnestic voorkomen van recidiverende of familiale trombose helpt niet bij het identificeren van patienten met deficienties aan anti- en ontstollings eiwitten.

Heyboer et al. N Engl J Med 1990; 323:1513

10

Gezien het gunstige effect van groepstherapie op de overleving van patienten met een gemetastaseerd mammacarcinoom verdient het aanbeveling meer onderzoek te doen naar de waarde van psychosociale ondersteuningstherapie bij patienten met kanker.

Spiegel et al. Lancet 1989; 888

11

Onderhoudstherapie met subcutaan toegediend G-CSF kan het infectie risico bij MDS patienten doen dalen.

Negrin et al. Blood 1990; 76: 36

12

Het van overheidswege aanmoedigen van de oprichting d.m.v. fusies van grote ziekenhuizen heeft nadelige gevolgen voor de patientvriendelijkheid en bevordert het ontstaan van kleine prive klinieken.

Rotterdam 12 juni 1991