

Stellingen behorende bij het proefschrift van M.A. Taams

1. Het verdient aanbeveling om voor een transoesofagaal echocardiografisch onderzoek een kortwerkende sedatie aan de patient te geven.
2. Transoesofagale echocardiografie van de mitralis- of aortaklep bij patienten met infectieuze endocarditis is momenteel de enige methode die in vivo pathologisch anatomische informatie geeft over het ziekteproces.
3. Transoesofagale echocardiografie is de beste diagnostische methode voor het vaststellen van peri-prosthetische mitralisklep insufficiëntie.
4. Bij patienten verdacht van acute aorta thoracalis dissectie is transoesofagale echocardiografie bij voorkeur de eerst aangewezen onderzoekmethode.
5. De klinische waarde van intravasculaire echografie moet nog worden aangetoond.
6. Het teken van Duroziez is één van de meest verwaarloosde symptomen in de klinische cardiologie.
7. De arrogantie van de onwetendheid kan even vernietigend zijn als de arrogantie van de deskundigheid.
(Ingelfinger F.J, N.E.J.M 1980, 303: 1507-1511)

8. Voor het merendeel heeft 300 jaar Westerse vooruitgang de rechten van de mens ontwikkeld ten koste van zijn plichten.
(Solzhenitsyn 1989)
9. Een vrouw “met de broek aan” is niet te vergelijken met “een man met een rok aan”.
10. Het feit dat mannen geen kinderen kunnen baren sluit geenszins uit dat mannen een postnatale depressie kunnen krijgen.
11. Golfers met een handicap zijn vaak nog verrassend valide.