

---

# Stellingen

- 1 Fontaneldrukmeting verdient de voorkeur boven palpatie van de fontanel.
- 2 Bij het meten van de fontaneldruk moet worden voorkomen dat de applicatiedruk invloed heeft op het meetresultaat.  
*(dit proefschrift)*
- 3 De intracraniële druk, gemeten via de fontanel met de Rotterdam Teletransducer is gelijk aan het vlakke stuk van de druk-diepte curve.  
*(dit proefschrift)*
- 4 Bij het interpreteren van de fontaneldruk moet rekening worden gehouden met de leeftijd van het kind.  
*(dit proefschrift)*
- 5 A- en B-golven zijn te registreren door fontaneldrukmeting.  
*(dit proefschrift)*
- 6 Bij een te snel groeiend hoofd dient altijd de fontaneldruk te worden gemeten.
- 7 De liften van de torens F, G en H in het Academisch Medisch Centrum worden, vanuit zowel medisch als economisch oogpunt, verre van optimaal gebruikt.
- 8 Gezien de tekort schietende aandacht van politiefunctionarissen voor het welzijn van arrestanten in politiecellen, verdient het aanbeveling de verzorging en bewaking van die arrestanten op alle politiebureaus toe te vertrouwen aan speciaal daarvoor opgeleide arrestantenbewaarders.
- 9 Gehandicapte kinderen nemen zoveel zorg en aandacht weg van hun niet-gehandicapte broers en zusters dat adequate begeleiding van alle gezinsleden wenselijk is.

10 De therapeutische waarde van anti-epileptica spiegels is die waarde waarbij de patiënt aanvalsvrij is en er geen bijwerkingen zijn.

11 De normaalwaarde van serumspiegels van anti-epileptica is nul.

*W.C.G. Overweg-Plandsoen*

*3 oktober 1990*