

Craniofaciale en dentale aspecten van het syndroom van Crouzon en Apert

1. Onderontwikkeling van het middengezicht en 'clockwise rotatie' van de onderkaak verergeren gedurende de groei bij het syndroom van Crouzon en Apert in vergelijking met de referentiepopulatie (dit proefschrift).
2. Vertraagde tandontwikkeling, tandagenesie en symmetrische agenesiepatronen komen vaker voor bij het syndroom van Crouzon en Apert in vergelijking met de referentiepopulatie (dit proefschrift).
3. Tandboogdimensies nemen nauwelijks toe tijdens de groei bij het syndroom van Crouzon en Apert in vergelijking met de referentiepopulatie (dit proefschrift).
4. Inzicht in afwijkende groei bij syndromale craniosynostose verbetert, als zowel de individuele patiënt als een grotere groep patiënten wordt vergeleken met de referentiepopulatie (dit proefschrift).
5. Vertraagde doorbraak van elementen en afwijkende tandboogvorm is een bepalende factor voor het bereiken van congruente tandbogen bij het syndroom van Crouzon of Apert (dit proefschrift).
6. De grote mate van certificering- en visitatiedrang in de gezondheidszorg geeft geen betere patiëntenzorg (Verdiepingsstudie transparantie kwaliteit van zorg, 2002).
7. Er zijn meer spieren nodig voor een lach dan voor een frons (Gray's Anatomy).
8. Wonen in een krimpregio is ongezond (RIVM).
9. Het doen van medisch onderzoek verbetert niet automatisch de eigen gezondheid (NVMO congres 2013).
10. De maatschappelijke consequenties van schaalvergroting in de veehouderij zijn vooraf moeilijk te voorspellen (Consumentenplatform, 2010).
11. De hân oan é ploech en de blik foarút.